



Algemene informatie

☎ 03 217 71 11

✉ ca.info@zas.be

Bezoekuren

- Verpleegafdelingen: van 14 tot 19.30 uur
- Intensieve zorg: van 14 tot 15 uur en van 18.30 tot 19.30 uur
- Brandwondencentrum:
 - High care: van 13.30 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 19.30 uur
 - Low care: van 13.30 tot 15.30 uur en van 17.30 tot 19.30 uur
- PAAZ:
 - ma-vr.: 18 tot 19.30 uur
 - woe-za-zo: 14 tot 16.30 uur
- EPSI:
 - ma-zo: 18 tot 19.30 uur
 - za-zo: 14 tot 16.30 uur

OVER

ZAS Cadix

ZAS Cadix is het modernste ziekenhuis van Antwerpen. Het is hoogtechnologisch, duurzaam en toekomstgericht.

ZAS Cadix bevindt zich aan de kop van park Spoor Noord, naast de gelijknamige Cadixwijk. Op een plaats waar park, water en stad samenkomen. Het grootste deel van de benedenverdieping is voorbehouden voor winkels en horecazaken, toegankelijk voor iedereen.

Hoe geraak je in ZAS Cadix?

Om het ziekenhuis binnen te gaan, gebruik je 1 van de 4 ingangen:

- **Ingang Dok:** aan de kant van de dokken en de tramhalte.
- **Ingang MAS:** aan de kant van het MAS en de Londenbrug.
- **Ingang Park:** aan de kant van het skatepark.
- **Ingang Centrum:** aan de kant van AP Hogeschool.

Alle 4 de ingangen geven toegang tot de gelijkvloerse verdieping van ZAS Cadix. Die is ingericht als '**zorgboulevard**' met zorgwinkels. Zo kunnen patiënten na hun afspraak of opname meteen verder geholpen worden.

ZAS Cadix is **elke dag geopend tussen 6.30 en 20 uur**. Buiten de openingstijden moeten patiënten en bezoekers gebruikmaken van de spoedingang en zich aanmelden aan de spoedbalie. Ook bezoekers die buiten de algemene openingsuren met de auto parkeren op -2, nemen nadien de lift naar spoed (op -1).

Dit is een rookvrije campus

ZAS Cadix is volledig rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangeduide rookzones.

Bereikbaarheid

Met de auto

Het adres van ZAS Cadix is Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen.

Om ZAS Cadix met de auto te bereiken, volg je de weg naast de Noorderlaanbrug. **Op je gps** geef je best **Asiadok-Westkaai** in. Dan kom je aan de parking uit.

Kiss & Ride

Wil je iemand snel afzetten of ophalen? Dan kan dat eenvoudig via de parking. Je kan 30 minuten gratis parkeren. Binnen- en buitenrijden gaat automatisch met de nummerplaatherkenning. Je hoeft je parkeerticket dus niet te valideren aan de automaat.

Lage-emissiezone (LEZ)

ZAS Cadix bevindt zich in een LEZ-zone.

Is jouw voertuig toegelaten? Wat kan je doen als je voertuig niet toegelaten is? Lees er alles over op [de website van Slim naar Antwerpen](#).

Parking

Als patiënt betaal je maximaal 5 euro, ongeacht de lengte van je bezoek of verblijf. Reekspatiënten van de Nierkliniek kunnen kosteloos parkeren.

Valideer je parkeerticket als je je inschrijft. Dat kan bij de onthaalpunten en aan de digitale kiosken in de zorgboulevard. Ook bij de spoeddienst, nierkliniek, chirurgisch dagziekenhuis en brandwondencentrum kan je je ticket valideren.

Ben je bezoeker of familielid? Dan gelden onderstaande parkeertarieven.

Parkeertijd	Parkeertarief
0 - 0,5 uur	€ 0
1 uur	€ 2,5
2 uur	€ 5,0
3 uur	€ 7,5
4 uur	€ 11,0
5 uur	€ 14,5
6 uur	€ 18
7 uur	€ 21,5
8 - 24 uur	€ 25

Wie vanop de **Noorderlaan** komt, moet rechts voorsorteren aan het kruispunt met de IJzerlaan. Draai dan rechtsaf en volg de weg naast de brug (zie roze pijlen op de foto).



Wie vanop de **Leien** komt, moet over de Noorderlaanbrug. Aan het kruispunt met de IJzerlaan sorteert je links voor. Sla links af en volg de weg naast de brug (zie roze pijlen op de foto). Je moet dus eerst de brug over, je kan het ziekenhuis niet rechtstreeks vanop de Leien bereiken.

Wie via de **Slachthuislaan/IJzerlaan** komt, sorteert links voor aan het kruispunt IJzerlaan-Noorderlaan. Steek de Noorderlaan volledig over en neem de weg linksaf naast de Noorderlaanbrug (rij niet de brug van de Noorderlaan op). Volg de roze pijlen op de foto.



Bezoekers die met de auto komen, kunnen gebruikmaken van de ondergrondse parkeergarage. Die rijd je in via de eerste toegangsleuf links.

Maximum inrijhoogte is 2,20 meter. Een dynamisch signalisatiebord geeft het aantal vrije parkeerplaatsen aan



Rij rechtdoor naar niveau -2, ook als je een parkeerplaats voor mindervaliden nodig hebt.

Met de fiets

ZAS Cadix is bijzonder goed bereikbaar met de fiets. Je kan gebruik maken van de **fietsenstallingen** vlak voor het ziekenhuis. Rond het ziekenhuis zijn verschillende **Velostations** beschikbaar:


- ZAS Cadix (128),
- Londenstraat (station 139),
- Cadix Oost (station 222),
- AP Ellermanstraat (station 164),
- Park Spoor Noord (station 124),
- Spoor Noord Skatebowl (station 136).

Met het openbaar vervoer

ZAS Cadix is bijzonder goed bereikbaar met de tram en bus.

- [Gebruik Google Maps.](#)

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- [Gebruik de routeplanner van De Lijn](#)
- [Plan je treinreis op de website van NMBS](#)

Bereken je route

✕
📍

Wandelafstand
5 min

📍 Geef me reisadvies

Filters en lagen

Voorzieningen

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van de widget om die verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar



Restaurant Aster

- Hoe vaak wordt er op de knoppen 'toon op kaart' en 'geef me reisadvies' geklikt binnen de widget?
- Vanuit welke site wordt er op deze knoppen geklikt binnen de widget?

Het restaurant vind je op de 3e verdieping. Je kan er terecht voor warme maaltijden, belegde broodjes, gebak of gewoon een lekkere koffie.

Openingstijden

- Maandag - vrijdag: van 8 tot 19.30 uur (keuken tot 19 uur)
- Weekend en feestdagen: van 11 tot 18 uur (keuken tot 17.30 uur)

Is het restaurant gesloten? In onze campus vind je twee automaten met dranken en snacks van 'Aster 24/7 service' op de Zorgboulevard. Daar kan je dag en nacht terecht voor een verfrissing of snelle hap.



Aster to go: winkel en drank en gebak om mee te nemen

Afhaalshop met fruit, ijs, bakkerijproducten en koffie. Je vindt Aster to go op de Zorgboulevard (gelijkvloers).

Openingstijden

- Maandag - vrijdag: van 8 tot 19 uur
- Weekend en feestdagen: van 11 tot 17 uur

Winkel/medische hulpmiddelen

	Wat?	Waar?	Openingsuren
<u>Hoorcentrum Aerts</u>	Hoorhulpmiddelen	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 9 - 12.30 uur en 13 - 17 uur Dinsdag 12 - 16 uur en 16.30 - 19.30 uur Weekends en feestdagen gesloten
<u>Sensotec</u>	Visuele hulpmiddelen	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag tot vrijdag 9 - 12 uur en 13 - 17 uur Weekends en feestdagen gesloten
<u>Energy Lab</u>	Sport- en voedingsbegeleiding	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag tot vrijdag 9 - 17 uur

			Weekends en feestdagen gesloten
<u>Zorgwinkel De Schakel</u>	Medische hulpmiddelen, thuiszorg en huishoudhulp	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag tot vrijdag 9 - 17 uur Zaterdag 11 - 14 uur Zon- en feestdagen gesloten
<u>Ontzorg</u>	Thuiszorg - Volledige ontzorging van zorgvragers, doorverwijzers en verpleegkundigen	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag tot vrijdag 9 - 17 uur Weekends en feestdagen gesloten
<u>Altrio</u>	Thuiszorg - ondersteuning van individuele patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen	Zorgboulevard (gelijkvloers)	Maandag tot vrijdag 9 - 17 uur Weekends en feestdagen gesloten

Wifi/telefoon

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

Rolstoelen

Er zijn rolstoelen voorzien aan

- ingang DOK
- ingang ziekenhuis op parking -2
- ingang spoed op -2

Zelfbedieningsloket stad Antwerpen

- Je vindt een zelfbedieningsloket van de stad in de inkomhal aan de inschrijvingskiosken.
- Je kan er **gratis en veilig persoonlijke documenten afdrukken en andere zaken regelen.**

Lees gratis online stripverhalen

Standaard Uitgeverij biedt via STRIPS.BE onze patiënten en bezoekers gratis en onbeperkt stripverhalen aan om te lezen op ons ZAS-netwerk. Ideaal als afleiding of om wachttijden wat sneller voorbij te laten gaan.

STRIPS.BE is een streamingplatform met een catalogus van duizenden stripverhalen: van De Kiekeboes, Suske en Wiske, Jommeke, Camille, De Blauwbloezen ... Voor jong en oud!

Hoe werkt het?

1. Verbind met het wifinetwerk van ZAS
2. Download de app STRIPS.BE op je smartphone of tablet (hier app-logo bijzetten)
3. Klik op het ZAS-icoon
4. Start met lezen!

Voor patiënten

Kluisjes

Diensten

In ZAS Cadix hebben alle kamers een kluis. Daarin kan je jouw persoonlijke spullen veilig achterlaten.


 Filter deze pagina



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Dienst

Algemene inwendige geneeskunde en infectiologie



Dienst

Anesthesie

Verdoving, pijnstilling



Expertisecentrum

Anesthesie voor kinderen

verdoving bij kinderen, pijnstilling bij kinderen



Expertisecentrum

Brandwondencentrum

verbranding, huidverbranding, huidirritatie



Expertisecentrum

Centrum voor genderzorg Antwerpen

CGA, transgenderzorg, gendercentrum, genderzorg, gendertransitzorg



Dienst

Diëtisten

voedingsadvies,
voedingsconsultatie



Dienst

Endocrinologie

hormoonziekte, suikerziekte,
diabetes, obesitas, bijnier,
hormonen, schildklier, hypofyse,
calciumproblemen



Dienst

Endocrinologie voor kinderen

kinderhormoonziekten, kinderen
met hormoonproblemen

1

2

3

4

5

6

7



Laatste »

Onderzoeken

Filter deze pagina

1 - 151 van 151



onderzoek hormonale stoornissen



24 uurs-EEG

24 uurs-elektro-encefalogram

Via bloed- en urineonderzoek wordt gekeken of er stoornissen zijn in je hormonenstofwisseling, zoals bijvoorbeeld afwijkingen in de (bij)schilddklier, hypofyse of bijnier.

Deze test meet 24 uur lang de hersenactiviteit om problemen op te sporen die we in korte tests niet altijd vinden. We kijken hoe de hersenen werken, ook tijdens de slaap.



24-uursbloeddrukmeting

Een draagbaar apparaat meet op vaste tijdstippen en tijdens dagelijkse activiteiten je bloeddruk. Deze reeks metingen geeft een objectief beeld van je bloeddruk.



6 minutenwandelttest

zesminutenwandelttest, 6MWT

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen 6 minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je hartslag.



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest, uitlokkings-test, provocatietest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.



Allergietest bij kinderen

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.



Angiografie

röntgenonderzoek bloedvaten, contrastonderzoek bloedvaten, bloedvatenonderzoek

Bij een angiografie maakt de radioloog de bloedvaten zichtbaar door er rechtstreeks een contrastvloei-stof in te spuiten en daarbij snel een aantal röntgenfoto's te maken.



Arteriële katheter

Een arteriële katheter is een kunststof buisje dat direct in een slagader wordt geplaatst.



Artrografie



BAEP-onderzoek

brainstem auditory evoked potential (BAEP)

Artrografie is een onderzoek waarbij we contrastvloeistof in een gewricht injecteren en er daarna röntgenbeelden van maken.

BAEP kijkt hoe je hersenen reageren op geluiden. De test helpt om gehoor- en zenuwproblemen in de hersenstam te ontdekken.



Beeldvorming bij (vermoeden van) kanker

Bij de diagnose en ook tijdens de behandeling en opvolging van vaste tumoren zijn meestal regelmatige beeldvormingsonderzoeken aangewezen.



Beenmergonderzoek

Bij een beenmergpunctie zuigt de arts met een naald wat beenmerg uit je bot. Bij een botbiopsie of botboring wordt er een stukje bot weggenomen. Het labo onderzoekt dat materiaal.



BERA-onderzoek

brainstem evoked response audiometrie, auditory brainstem response (ABR)

Met deze objectieve gehoortest meten we het gehoor tot op het niveau van de hersenstam (hersenstamaudiometrie).



Biopsie arteria temporalis

Bij een temporalis biopsie halen we onder lokale verdoving een klein stukje van 2 tot 4 cm weg uit een bloedvat bij de slaap.



Blaasfunctieonderzoek

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De uroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



Bloedafname

Voor een bijkomend bloedonderzoek neemt de zorgverlener bloed af. Je bloed wordt in het labo geanalyseerd.



Bloedgasanalyse

bloedgasbepaling, arteriële bloedgasbepaling, arteriële bloedgasanalyse, arteriële bloedpunctie, arteriepunctie

We nemen een bloedstaal uit de slagader in je pols om o.a. het zuurstof- en



Bloedonderzoek

Via bloedonderzoeken schatten we de nierfunctie in, kijken we de zoutbalansen na en sporen we risicofactoren op hart- en vaatlijden zoals diabetes en

koolzuurgasgehalte in je bloed te meten. Zo komen we te weten hoe goed je longen functioneren.

cholesterolverhoging op.



Bloedonderzoek bij IBD

In je bloed kunnen we zien of je een ontsteking, bloedarmoede of een vitaminetekort hebt.



Bloedonderzoek bij reuma

In dit onderzoek bekijken we de waarden van de verschillende stoffen in het bloed. Abnormaal hoge of lage waarden of specifieke biomarkers kunnen wijzen op bepaalde aandoeningen.



Bloedonderzoek bij vaste tumoren

Bij de diagnose, tijdens en na de behandeling van kanker gebeurt regelmatig een bloedonderzoek. Dat is nodig om de impact van de ziekte en therapie op het lichaam na te gaan.



Bloedonderzoek om mucoviscidose op te volgen

Met een bloedonderzoek kunnen we bij mucopatiënten de werking van de nieren, lever en alvleesklier nagaan en de hoeveelheid vitamines meten.



Borstbiopsie

tru-cut biopsie, invasief weefselonderzoek

Bij een borstbiopsie verwijdert de arts wat weefsel van de borstklier. Dat weefsel wordt daarna onder de microscoop onderzocht om te zien of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.



Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



Botmeting

botdichtheidsmeting, botdensitometrie (BMD), bone mineral content (BMC), Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA of DEXA), DXA-scan, DEXA-scan



Capillaroscopie

nagelriemonderzoek

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld.

Met dit onderzoek meten we de botdensiteit of het kalkgehalte in je bot. Zo kunnen we zien of je osteoporose hebt en of je een verhoogd fractuurrisico hebt.



Capsuleonderzoek van de dunne darm

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen. In de praktijk is dit onderzoek zelden nodig.



Cardiale MRI

Met deze techniek maakt de cardioloog gedetailleerde beelden van je hart. Hij krijgt een beeld van o.a. de grootte van de hartkamers en de dikte van de hartspierwand.



Centraal veneuze katheter

Een centraal veneuze katheter is een kunststof buisje dat de arts in een grote ader plaatst.



Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.



Cone beam CT-scan

Een cone beam CT is vergelijkbaar met een CT-scan, maar kan met minder straling 3D-beelden maken van de aangezichtsschedel.



Continue nierdialyse

Sommige patiënten worden dag en nacht gedialyseerd. Vooral instabiele patiënten met een erg lage bloeddruk en patiënten met ernstige infecties.



Coronaire CT-angiografie

Met contrastvloeistof en een speciale scanner die beelden van de kransslagaders, hartspier en hartkleppen maakt, spoort de cardioloog eventuele vernauwingen op.



Coronarografie

röntgenonderzoek kransslagaders

De arts brengt via je pols of lies een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter

spruit hij contraststof en röntgenstralen in die de kransslagaders in beeld brengen.



CT-scan

computertomografie

Een CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden van je lichaam. Om het contrast tussen de verschillende weefsels te vergroten, krijg je vaak een contrastmiddel toegediend.



Dermoscopie

Bij dermoscopie bekijken we een moedervlek via een loep of scan. Zo weten we of deze goed- of kwaadaardig is.



Desmopressinetest

DDAVP-test

Deze test meet het effect van het geneesmiddel desmopressine (onder andere verkocht onder de merknaam DDAVP) op de bloedstolling in je bloed.



Diagnostische hysteroscopie

Kijkonderzoek baarmoeder

Bij een diagnostische hysteroscopie kijken we in de baarmoeder met een kleine camera die we inbrengen via de vagina. Zo kan de arts afwijkingen in de baarmoeder opsporen.



Diagnostische laparoscopie

kijkonderzoek buikholte

Een diagnostische laparoscopie is een kijkonderzoek van de buikholte. De arts brengt een kleine camera in om je buikholte of organen te bekijken.



Doppleronderzoek

dopplertechniek, kleurendoppler, kleurendoppler-echografie

Met de dopplertechniek worden naast de grijswaarden van het echografisch onderzoek ook kleuren afgebeeld en hoorbare geluiden geproduceerd.



Duplex arteria temporalis

Bij dit onderzoek maken we gebruik van 2 technieken die werken met geluidsgolven: echografie en doppler. We kijken naar de



Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of

slagader aan de zijkant van het hoofd bij de slaap.



Duplexonderzoek craniale bloedvaten

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten van je hoofd en rond je oksel onderzocht bij vermoeden van ontsteking van de bloedvaten (arteritis temporalis).

verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



Echo-endoscopie

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je spijsverteringskanaal. Soms nemen we weefsel af voor onderzoek.



Echocardiografie

Een echo geeft de cardioloog via geluidsgolven meer informatie over de afmeting van de hartkamers, de wand- en klepbewegingen en eventuele afwijkingen.



Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie borstkas

echografie thorax

Met dit onderzoek kan je longarts met onhoorbare (ultrasone) geluidsgolven afwijkingen opsporen in je borstkas zoals vochtophopingen.



EEG

elektro-encefalogram

EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.



Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek,
elektromyografisch onderzoek,
zenuwgeleidingsonderzoek

Met een elektromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en



Elektro-encefalogram

Een EEG (elektro-encefalogram) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.

prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het

h⁺



Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje

De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.



Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Met hoogtechnologische meettechnieken en meetelektroden onderzoekt de arts de elektrische werking van je hart en spoort hartritmestoornissen op.



Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS) TransBronchial Needle Aspiration (TBNA)

Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.



Endocriene functietesten

We kijken of de endocriene klieren goed functioneren, bv. schildklier of bijnier. We dienen jou een stof toe en kijken hoe je daarop reageert door bloed-, urine- en/of zweetesten.



Endotracheale tube

De endotracheale tube wordt via mond (of neus) in de luchtpijp gebracht om de beademing patiënt te kunnen beademen via de beademingsmachine.



Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.



Epidurale pijnstilling

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (ruggenprik) dient de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je

galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.



Erfelijkheidsonderzoek

Met dit type onderzoek bekijkt een arts of je een aandoening in je genen hebt.



Ergospirometrietest

Deze uitgebreide inspanningstest geeft een zeer compleet beeld van de conditie van mensen met hartproblemen en vergelijkt die met de resultaten van gezonde mensen.



Event recording

Je krijgt een event recorder mee naar huis om een opname van je hart te maken op het moment dat je een hartritmestoornis voelt. De cardioloog beoordeelt nadien alle opnames.



Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de evenwichtsorgaantjes in je binnenoor en geven we de werking van je evenwichtssysteem weer in grafieken.



Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



Gangonderzoek bij ouderen

Om ongevallen te voorkomen, kan je via het geriatrisch dagziekenhuis je mobiliteit, gangstoornissen en/of herhaaldelijk vallen in kaart laten brengen.



Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.



Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftrillingen (toonhoogte).



Geriatrische evaluatie

geriatrisch assessment, multidisciplinair complex geriatric advies, multidisciplinair complex geriatric advies, Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Met een geriatrisch assessment kunnen we de vaardigheid van ouderen evalueren op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal vlak.



Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP) , Goldmann gezichtsveldonderzoek

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



Holtermonitoring

Met een draagbaar apparaat op de borstkas meet de cardioloog voortdurend de elektrische activiteit van je hart om de oorzaak van de hartritmestoornis op te sporen.



Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



Huidtesten voor medicatie-allergie

huidtest voor medicijnallergie, huidtest voor geneesmiddelenallergie, huidpriktest voor medicatie-allergie, huidtest met geneesmiddelen, allergietest medicatieovergevoeligheid

We controleren of je huid reageert op een kleine, verdunde hoeveelheid van een specifiek medicijn.



Hyperventilatietest

De longarts vraagt je om in een sneller tempo te ademen om het koolzuur in de uitgeademde lucht te kunnen meten. De test dient om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen.



Inspanningstest

fietstest, ergometrie

Tijdens deze test lever je op een speciale hometrainer een inspanning. Voor, tijdens en na de test gebeuren er metingen die de arts vertellen hoeveel je hart belast wordt.



Internistisch onderzoek

Bij dit onderzoek bekijken we het lichaam in zijn geheel en niet een specifiek onderdeel. Hierbij maken we soms ook gebruik van bloed-, urine- of andere onderzoeken.



Intracraniële katheter

Een intracraniële katheter wordt in het operatiekwartier geplaatst door de neurochirurg tussen de twee hersenhelften.



Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.



Isotopenonderzoek (MIBI-scan)

Dit onderzoek brengt de doorbloeding en de pompfunctie van je hart in beeld. Dat gebeurt aan de hand van een licht radioactieve stof die de arts via een infuus inspuit.



Jaaronderzoeken diabetes

Jaaronderzoeken zoals oogfundus-, urineonderzoek en EKG helpen om problemen vroeg te ontdekken, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.



Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie, cystoscopisch onderzoek

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas. Dat gebeurt onder lokale verdoving.



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Kijkoperatie longvliezen

endoscopie longvliezen, pleuroscopie

Bij een pleuroscopie kijkt je arts met een kleine camera of pleuroscop naar je longvliezen (pleurabladen). Je bent hierbij verdoofd, maar je blijft zelf ademen.



Kleurenechografie

Een kleurenechografie brengt via een probe op de borstkas of slokdarmsonde de structuur en bloedstroom binnen het hart gedetailleerd in beeld.



Kleurstoffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.



Klierbiopsie

Bij een klierbiopsie neemt de hematoloog een klier weg om die te laten onderzoeken in het labo. Het is een kleine ingreep onder lokale verdoving.



Klinisch onderzoek bij brandwonden

De arts onderzoekt de brandwonden, bepaalt de diepte en uitgebreidheid en dient de eerste zorg toe: de wonden koelen, spoelen en ontsmetten.



Klinisch onderzoek orthopedie

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



Klinisch onderzoek reumatologie

Bij dit onderzoek onderzoeken we je van kop tot teen waarbij het bewegingsstelsel meestal centraal staat. Soms komen er bijkomende evaluaties van het hart, de longen, enz. bij.



Lactose-ademtest

Waterstofademtest, lactoseblaastest

Om vast te stellen of je kind lactose-intolerant is, meet de arts via een lactoseademtest hoeveel waterstof er in de adem van je kind zit.



Lactose-intolerantietest

lactose-blaastest, waterstof-ademtest

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.



Laser Doppler Imaging-scan



Leverbiopsie

LDI-scan

Deze scan bepaalt het genezingspotentieel van brandwonden en de noodzaak tot operatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd tussen de 48 en de 120 uur na de verbranding.

leverpunctiebiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.



Longfunctieonderzoek

longfunctietest

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Longpunctie

punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.



Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.



Lumbaalpunctie

ruggenprik

Bij een lumbaalpunctie zuigt de arts met een dunne naald een kleine hoeveelheid vocht uit je ruggenmergkanaal. Het labo onderzoekt dat ruggenmergvocht of liquor.



Mammografie

röntgenfoto borsten

Een mammografie brengt met röntgenstralen het borstweefsel in beeld. Het onderzoek dient om borstletsels op te sporen en op te volgen. Het duurt ongeveer een kwartier.



Medische beeldvorming

Om een beeld van je lichaam te krijgen, kan de spoedarts een RX, CT-scan, echografie of NMR uitvoeren. Die beelden zijn heel belangrijk om eventuele afwijkingen te ontdekken.



MEP



Microscopisch onderzoek bij schimmelinfecties en vermoeden

motor evoked potential

MEP kijkt hoe je spieren reageren wanneer de hersenen magnetisch worden gestimuleerd. Zo kunnen we zien hoe goed je zenuwen en spieren werken.

van schurft

Als we vermoeden hebben van schimmelinfectie of schurft, nemen we een staaltje van de huid. Dit onderzoeken we microscopisch.



Microscopisch onderzoek

micro-otoscopie

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



MRI

magnetic resonance imaging, magnetische resonantie (MR), MR-onderzoek, nucleaire magnetische resonantie (NMR), kernspintomografie (KST), kernspinresonantie

Een MRI maakt met een sterke magneet in elke gewenste richting doorsneefoto's van je lichaam. Het onderzoek duurt meestal ongeveer 20 minuten.



MRI van de dunne darm

enterografie

Bij een enterografie maken we met een MRI-toestel via radiogolven foto's van je dunne darm. Hiervoor ga je op een tafel liggen die een tunnel wordt geschoven.



Muscoskeletale echografie

MSK-echografie

Bij dit onderzoek stuurt een toestelletje geluidgolven door je lichaam. Die weerkaatsen op je spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten, waardoor we ze zien op een scherm.



Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



Neusdoorgankelijkheidstest



Neuspotentiaal meting

rhinomanometrie

Bij een rhinomanometrie meten we hoeveel lucht er door je neus gaat als je in- en uitademt. Zo achterhalen we de weerstand en in welke mate er sprake is van een verstopping.

NPD-meting

Zout bestaat uit de stoffen natrium en chloor. De arts kan die meten in de neus om te onderzoeken hoe in het lichaam zout van de ene cel naar de andere gaat.



NMR

Nucleaire Magnetische Resonantie

Een NMR-scan maakt gedetailleerde beelden van binnen in het lichaam. NMR werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven



NO-meting

FeNO-onderzoek

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de lucht die je uitademt. Zo kunnen we luchtwegontstekingen en gevoeligheden van je luchtwegen opsporen.



Onderzoek door de spoedarts

De spoedarts bekijkt je klachten zorgvuldig en voert tests uit om te bepalen wat er aan de hand is. Is er dringend bijkomend onderzoek nodig? Dan plant de spoedarts dat in.



Onderzoek van je stoelgang

Zijn je darmen ontstoken? Dan vinden we een bepaald eiwit in je stoelgang: calprotectine. Je stoelgang kan ook aantonen of je last hebt van een virus, bacterie of parasiet



Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatietonometrie of met een 'luchtpuf' (luchttonometrie of pneumotonometrie).



Oogonderzoek bij kinderen



Orthopantomogram (OPG)

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en onderzoeken het hoornvlies, de lens, de oogzenuw en het netvlies.



Percutane tracheotomie

De percutane tracheotomie is voor patiënten die langdurige beademing nodig hebben.

Dit is een röntgenfoto van de volledige kaak (dus ook de kaakgewrichten) die ook alle tanden toont.



Perifere katheter

Een perifere katheter zorgt ervoor dat vocht en medicijnen rechtstreeks via de bloedbaan worden toegediend.



Picco- of SwanGanzKatheter

Deze speciale katheters worden in een centrale ader of slagader geplaatst. Met deze katheters kunnen we het hartdebiet en de vullingstoestand opvolgen.



Pijndiagnose

pijndiagnostiek

Als je pijn signaleert, gaat je arts op zoek naar de oorzaak om die indien mogelijk weg te nemen en je pijn te verlichten.



Pijnmeting

NRS-score

Bij een pijnmeting vraagt de zorgverlener om je pijn uit te drukken in een cijfer tussen 0 (geen pijn) en 10 (de ergst denkbare pijn).



Pijnmeting bij kinderen

Om pijn goed te kunnen behandelen, moet het eerst duidelijk zijn hoe ernstig de pijn is. Om dat te weten te komen, geeft je kind of de verpleegkundige de pijn een 'score'.



Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.



Plaskalender

mictielijst

Als je vaak moet plassen kan de uroloog veel informatie halen uit een plaskalender. Je houdt daarvoor 3 dagen en 3 nachten bij hoeveel je drinkt en meet je plasvolumes op.



Preoperatief onderzoek bij ouderen

Voor een operatie, volledige verdoving of sedatie, is het zinvol om bij oudere patiënten een bijkomend geriatrisch risicoprofiel op te maken.



Preoperatieve voorbereiding

preoperatief nazicht, preoperatieve screening (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



Preoperatieve voorbereiding bij kinderen

preoperatief nazicht, preoperatieve screening bij kinderen (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie bij je kind de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



Prostaatbiopsie

biopsie prostaat, prostaatweefselonderzoek, transperineale prostaatbiopsie, MRI-geleide prostaatbiopsie

Als je mogelijk prostaatkanker hebt, neemt de uroloog met een holle naald stukjes weefsel uit de prostaat om te laten onderzoeken.



Provocatietest voor bronchiale hyperreactiviteit

histamineprovocatietest, metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de gevoeligheid van je luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine of metacholine in, een prikkelende maar onschadelijke stof.



PSA-meting

PSA-onderzoek, PSA-test

PSA (prostaat specifiek antigeen) is een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt. Met een bloedonderzoek kan je arts de hoeveelheid PSA in je bloed meten.



Rechterhartkatherisatie

De arts brengt een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter meet hij de druk, het hartdebiet en het zuurstofgehalte.



Röntgenonderzoek

radiografie, RX, RX-onderzoek, conventionele radiologie, röntgenfoto

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en structuren van je lichaam zichtbaar. Soms krijg je eerst een contrastmiddel toegediend.



Rugpijn onderzoeken

Een onderzoek om je rugpijn in kaart te brengen en eventueel een behandelplan op te stellen.



Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.



Slokdarmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.



Spermaonderzoek na sterilisatie

Met dit onderzoek controleren we of een sterilisatie gelukt is. Als de zaadleiters succesvol afgesloten zijn, mogen er geen bewegende zaadcellen meer in het sperma aanwezig zijn.



Sputumtest

Voor de behandeling van luchtweginfecties moeten we weten welke bacteriën in je luchtwegen zitten. Daarom laten we regelmatig fluimen (sputum) onderzoeken in het laboratorium.



SSEP

somato sensory evoked potential

SSEP test hoe je hersenen reageren op aanraking. We kijken dan hoe snel die gevoelsprikkels je hersenen bereiken.



Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd,
kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



Telemonitoring bij hartproblemen

Via telemonitoring zenden geïmplanteerde toestellen, zoals pacemakers, ICD's en CRT's, elke nacht belangrijke informatie door naar de arts, die deze metingen dagelijks bekijkt.



Teleradiografie (TELE)

Dit is een radiologisch onderzoek waarbij röntgenfoto's het aangezicht in beeld brengen vanuit vooraanzicht en zijaanzicht.



Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een kunststof buis die tussen de twee longbladen geplaatst wordt om vocht en/of lucht weg te laten lopen of weg te kunnen zuigen.



Tilttest

Tijdens dit onderzoek lokt de cardioloog, onder gecontroleerde omstandigheden, flauwvallen uit. Zo kan hij de oorzaak van frequent flauwvallen of duizeligheid opsporen.



Transcraniële duplex

Transcraniële duplex is een neurologische test met geluidsgolven om te kijken hoe het bloed in je hersenen stroomt en om problemen in je bloedvaten te vinden.



Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening,
baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan op termijn tot baarmoederhalskanker leiden.



Urinecytologie

Een urinecytologie geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen in je urine.



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van je plasstraal te meten. Je plast daarvoor in een flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.



Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige
gynaecologische echografie

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.



VEP

visual evoked potentials

VEP bekijkt hoe je hersenen reageren op flitsen of patronen. Zo controleren we of er problemen zijn bij het zien.



Voedselprovocatietest

provocatietest voedselallergie, testen op voedselallergie, allergieprovocatietest

Tijdens een voedselprovocatietest krijg je kleine beetjes van een bepaald voedingsmiddel om op een veilige manier te weten te komen of je er nog allergisch op reageert.



Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

Behandelingen

≡ Filter deze pagina

1 - 399 van 399



Aansluiten dialyse-apparaat

Er bestaan verschillende manieren om dialysepatiënten aan te sluiten op een dialyse-apparaat. Dit kan met een fistel of een katheter.



Ablatie bij hartritmestoornissen

ablatie bij voorkamerfibrillatie (VKF), katheterablatie bij VKF

Door gebruik te maken van warmte- of koude-energie verhelpt de arts de elektrische storing in je hart.



Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen
uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



Allogene stamceltransplantatie

allogene SCT, beenmergtransplantatie, stamceltherapie

Bij een allogene stamceltransplantatie krijg je na intensieve chemotherapie en/of radiotherapie gezonde stamcellen van een donor om zieke bloedcellen in je beenmerg te vervangen.



Analgetica

Analgetica zijn medicijnen die gebruikt worden om pijn te verzachten of weg te nemen. Ze werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale zenuwstelsel.



Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesitherapie of een operatie.



Alvleesklierchirurgie of pancreaschirurgie

pancreasoperatie, operatie aan de alvleesklier

Bij bepaalde aandoeningen aan de pancreas maakt een operatie deel uit van de behandeling, meestal om de aangetaste delen van de pancreas weg te halen.



Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



AR-chirurgie voor het plaatsen van een prothese

augmented reality, AR-operatie, NextAR, AR-ingreep

Bij AR-chirurgie ziet de chirurg tijdens de ingreep zowel de operatietafel als informatie uit een CT-scan door een AR-bril. De arts hoeft niet weg te kijken tijdens de operatie.



Armlift

Een armlift is een ingreep om slappe of loshangende huid aan de binnenkant van de bovenarmen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.



Arthroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Arthroscopie schouder

kijkoperatie schouder, arthroscopie schouder

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de schouder vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Autologe stamceltransplantatie

autologe SCT, stamceltherapie, beenmergtransplantatie

Een stamceltransplantatie vervangt zieke stamcellen in je beenmerg door gezonde. Bij een autologe stamceltransplantatie komen de gezonde stamcellen uit je eigen bloed.



Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.



Arthroscopie knie

kijkoperatie knie, arthroscopie knie

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het kniegewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



Arthroscopie van de heup

kijkoperatie heup, arthroscopie heup, heupartroscopie

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het heupgewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



Banded bypass

Deze ingreep is een aanvulling op een gastric bypass. De chirurg plaatst een extra ring rond je mini-maag. Zo kunnen je nieuwe maag en je dunne darm niet uitrekken.



Bandje tegen urineverlies bij mannen

male sling

Bij deze ingreep plaatst de arts een 'bandje' (male sling) onder de plasbuis om die te ondersteunen en zo urineverlies tegen te gaan.



Bandje tegen urineverlies bij vrouwen

netje tegen urineverlies, tape tegen urineverlies, suburethrale sling, urethrasling, TVT, TVT-O, TOT

De uroloog plaatst een smal strookje synthetisch materiaal onder de plasbuis (urethra). Dat ondersteunt de plasbuis en gaat urineverlies tegen.



BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.



Begeleiding bij ongeplande zwangerschappen

begeleiding bij ongewenste zwangerschap, zwangerschapsonderbreking, abortus

Als je ongepland zwanger bent en twijfelt over je zwangerschap, dan kan Labyrint je medische en psychosociale begeleiding bieden.



Behandeling afasie

De logopedist leert je de handelingen voor het dagelijks leven opnieuw aan en blijft die trainen. Hij/zij zet ook in op ondersteunde communicatie om je communicatie te verbeteren.



Behandeling artrose aan de enkel

Enkelartrose, kraakbeenslijtage enkel, slijtage enkelgewricht, gewrichtsslijtage enkel

Slijtage van het kraakbeen in het enkelgewricht leidt tot pijn, stijfheid en verminderde beweging. Het ontstaat met ouder worden, maar mogelijk ook na een breuk of ernstig trauma.



Behandeling astma

Dikwijls is een behandeling met een puffer nodig. De arts en/of verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik ervan.



Behandeling avasculaire necrose (AVN)

osteonecrose, botnecrose, heupnecrose, ischemische botnecrose

Door een verminderde of onderbroken bloedtoevoer sterft je botweefsel af. Dat veroorzaakt pijn, verzwakt het bot en leidt op termijn tot gewrichtsproblemen en mogelijk artrose.



Behandeling blaaskanker

Bij blaaskanker zijn naast een operatie soms ook blaasspoelingen, chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling bronchiëctasieën

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het voorkomen van infecties.



Behandeling COPD

behandeling chronisch obstructief longlijden,
behandeling chronisch obstructieve longziekte,
behandeling chronic obstructive pulmonary disease

De behandeling van COPD steunt onder andere op rookstop, inhalatietherapie, voldoende beweging, vaccinaties, regelmatige opvolging en longrevalidatie.



Behandeling dysartrie

De logopedist richt zich op je ademhaling, resonantie, prosodie, stemgeving en/of articulatie. Hij/zij leert je strategieën aan om de verstaanbaarheid van je spraak te verhogen.



Behandeling dysfagie

De logopedist maakt gebruik van revaliderende of compenserende technieken, of een combinatie van beide.



Behandeling dysfonie

De logopedist start met een stemtherapie om je houding en ademhaling te verbeteren. Je doet stemontspannende en stemversterkende oefeningen.



Behandeling en opvolging botontkalking en gewrichtslijden bij ouderen

geriatrisch zorgpad osteoporose - gewrichtslijden



Behandeling en opvolging ijzertekort bij ouderen

Heb je een aanhoudend ijzertekort, ook al neem je ijzertabletten? Of verdraag je die tabletten niet goed? Dan kun je in het

In het geriatriesch dagziekenhuis gaan we na in hoeverre osteoporose bij jou aanwezig is en werken we een gepersonaliseerd zorgplan uit.



Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.

geriatriesch dagziekenhuis via een infuus ijzer krijgen.



Behandeling erectiestoornissen

Je leert een gezonde levensstijl ontwikkelen met voldoende beweging. Indien nodig schrijft de uroloog medicijnen voor. In heel specifieke gevallen is een penisprothese een optie.



Behandeling goedaardige prostaatvergroting met medicijnen

medicamenteuze behandeling goedaardige prostaatvergroting

Je kan medicijnen krijgen die plasklachten verbeteren en/of je prostaat verkleinen.



Behandeling hemofilie

De behandeling van hemofilie bestaat uit de toediening (inspuiting) van stollingsfactoren om het tekort aan stollingseiwit te compenseren.



Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.



Behandeling heupimpingement

impingement van de heup, FAI, femoroacetabulair impingement, inklemming van de heup

Het dijbeen en de heupkom raken elkaar op een abnormale manier. Dat zorgt voor pijn, beperkt je beweeglijkheid en kan op termijn leiden tot letsels of artrose aan de heup.



Behandeling hydrocoele bij volwassenen

behandeling hydrocele, behandeling vochtophoping in de balzak, behandeling waterbreuk, herstel waterbreuk, herstel zwelling in de balzak, hydrocoeleherstel,



Behandeling hypersensitiviteitspneumonitis

Soms kan stoppen van de oorzakelijke medicatie of ingeademde stof voldoende zijn

operatie hydrocoele, hydrocoelecorrectie, hydrocoeleresectie, hydrocoele communicans

Hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee vliezen rond de teelbal. Daardoor zwelt de balzak op. Tijdens een operatie kan de uroloog dat vocht wegnemen.

maar vaak zijn immuunonderdrukkende medicijnen nodig.



Behandeling interstitieel longlijden

Medicijnen kunnen de ontstekingen in je longen onderdrukken. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt af van de oorzaak. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling klaplong

behandeling pneumothorax

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de soort en ernst van de klaplong. Soms is het nodig om een drain te plaatsen of een kijkoperatie uit te voeren.



Behandeling labrumletsel

labrumscheur, labrumruptuur, heuplabrumblessure

Net als een meniscus in de knie kan het labrum in je heup scheuren. Het gevolg is een zeurende pijn in de liesstreek waardoor stappen en andere bewegingen moeilijker worden.



Behandeling longembolie

behandeling longembool, behandeling bloedklonter in longslagader, behandeling bloedstolsel in longslagader, behandeling afsluiting longslagader, behandeling trombose in de longen, behandeling Pulmonary Embolism (PE)

Een longembolie kan behandeld worden met bloedverdunners of antistollingsmiddelen. Andere behandelopties zijn de bloedklonter wegzuigen of via een operatie wegnemen.



Behandeling longhypertensie

De behandeling van longhypertensie hangt af van de oorzaak, de ernst en de aanwezigheid van andere ziekten. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwel, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling longontsteking

behandeling pneumonie

Een longontsteking kan meestal goed behandeld worden met antibiotica. Soms is een specifieke gerichte behandeling nodig.



Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



Behandeling meniscusscheur

gescheurde meniscus, meniscusletsel

Je meniscussen houden je knie stabiel. Een geforceerde beweging of slijtage kan een meniscusscheur veroorzaken. Er zijn verschillende manieren om een scheur te behandelen.



Behandeling met fillers

Een filler is een vloeibare gel die we gebruiken om diepe rimpels of groeven te verminderen, volume toe te voegen of de vorm van het gelaat te verbeteren.



Behandeling mucoviscidose

Bij mucoviscidose volgen we nauwgezet problemen met de longen en de spijsvertering op.



Behandeling na het verwijderen van een tumor uit het hoofd- en halsgebied

Als een tumor uit je mondholte verwijderd wordt, ervaar je de eerste weken of maanden na de operatie vaak problemen met eten en spreken. De logopedist richt een behandeling op.



Behandeling nierkanker

Bij nierkanker zijn naast een operatie soms ook doelgerichte therapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling perifere aangezichtsverlamming

De logopedist werkt volgens de principes van de mimetherapie. Hij/zij geeft oefeningen om de spiergroepen en delen van je lichaam voor je expressie bewust te gebruiken.



Behandeling pleuravocht

Je longarts plaatst een naald of een slangetje (thoraxdrain) tussen je ribben om het opgehoopte vocht tussen je longvliezen weg te halen.



Behandeling primair progressieve afasie

PPA

Mensen met PPA en hun naasten kunnen baat hebben bij begeleiding door een logopedist. Een logopedisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de diagnosestelling.



Behandeling prostaatkanker

Mogelijke behandelingen voor prostaatkanker zijn actieve opvolging, een operatie, radiotherapie en hormoontherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling sarcoïdose

Meestal gaat de ziekte vanzelf over. Soms is medicatie nodig om het immuunsysteem te onderdrukken.



Behandeling spermatocoele

behandeling spermatocoele, operatie spermatocoele, operatie bijbalcyste, operatie epididymiscyste, wegname bijbalcyste, spermatocoeleresectie

Een spermatocoele is een cyste van de bijbal (ligt tegen de teelbal). Tijdens een operatie kan de uroloog de cyste wegnemen.



Behandeling spraakapraxie

Deze therapie start meestal met het deblokkeren van je spraak. Als dat een succes is, drilt de logopedist op woorden, woordgroepen en eventueel zinnen.



Behandeling spraakmoeilijkheden na een totale laryngectomie

Bij een totale laryngectomie verwijdert de arts je stemplooien, waardoor je na de operatie niet meer kan praten op de gewone manier. De logopedist leert je opnieuw praten.



Behandeling teelbalkanker

Bij teelbalkanker zijn naast een operatie soms ook chemotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling teelbaltorsie bij volwassenen

behandeling torsio testis, behandeling teelbaldraaiing

De uroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



Behandeling tuberculose

Als je tuberculose hebt, kan je in principe volledig genezen met antibiotica.



Behandeling urineverlies bij mannen

behandeling urine-incontinentie bij mannen

Mogelijke opties zijn levensstijlaanpassingen, bekkenbodemspieroefeningen, medicatie en/of de plaatsing van een male sling of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling urineverlies bij vrouwen

behandeling urine-incontinentie bij vrouwen

Mogelijke opties zijn bekkenbodemkine, medicatie en/of de plaatsing van een 'bandje' of 'sling' (suburethrale sling) of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling van brandwonden

Eerst water, de rest komt later. Een verbranding vraagt zo snel mogelijk stromend lauw water gedurende 20 minuten. Gebruik zeker geen ijs op de huid.



Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



Behandeling van spataders

behandeling van varices

Via een echo controleert de dokter de doorstroming in de bloedvaten en worden spataders zichtbaar. Een behandeling is mogelijk met of zonder operatie.



Behandeling varicocele bij volwassenen

behandeling varicocele, behandeling spatader aan de teelbal

Varicocele is een spatader ter hoogte van de teelbal. De meest courante behandeling gebeurt bij de radioloog. Die maakt het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.



Behandeling vernauwing beenslagader

percutane transluminale angioplastie, PTA, ballondilatatie, dotteren

De meest gebruikte behandeling bij een vernauwde beenslagader is een angioplastie of dotterbehandeling. Met een ballonnetje maakt de chirurg het vernauwde bloedvat weer open.



Behandeling vernauwing plasbuis

urethrotomie, Sachse urethrotomie, urethroplastie

De uroloog kan meestal de vernauwing in je plasbuis met een kijkinstrument openmaken (urethrotomie). In zeldzame gevallen is een uitgebreidere open operatie nodig (urethroplastie).



Behandeling vernauwing urineleider bij volwassenen

ureter-reïmpplantatie, heraanleg urineleider in de blaas, herstel vernauwing urineleider

Bij een vernauwing van de aanhechting van de urineleider en de blaas maakt de uroloog de urineleider los van de blaas en maakt die op een andere plaats terug vast aan de blaas.



Behandeling Von Willebrandziekte

Medicijnen kunnen voor een betere stolling zorgen. Bij vrouwen kunnen hormonale behandelingen helpen. Soms krijg je de Von Willebrandfactor van gezonde personen toegediend.



Behandelopties bij ontbrekende tanden

Het kan gebeuren dat je één of meerdere tanden verliest. Een kroon, brug, implantaat of prothese kan ontbrekende tand(en) vervangen.



Behandelschema's medicijnen voor hoofd-halstumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



Behandelschema's medicijnen voor spijsverteringstumoren



Behandelschema's medicijnen voor urologische tumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



Behandelschema's medicijnen voor bloed- en lymfeklierkanker

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar het best mee om? Per medicijn geven we uitleg.

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



Bekkenbodemkinesithérapie

bekkenbodemtherapie, bekkenbodemkiné, bekkenbodemoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, pelvische reëductie

Met bekkenbodemkinesithérapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodemspieren.



Bekkenbodemoperatie

Een operatie aan je bekkenbodem om bijvoorbeeld incontinentie of een endeldarmverzakking te behandelen.



Besnijdenis bij volwassenen

circumcisie, besnijding

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de arts een deel of de volledige voorhuid van de penis weg om ontstekingen van de eikel of plasproblemen op te lossen.



Bewegingsprogramma bij de ziekte van Bechterew

spondylitis ankylosans revalidatie

Bij de ziekte van Bechterew zijn je gewrichten in je rug zo lang ontstoken, dat ze stijver worden en niet meer goed kunnen bewegen. Gerichte oefeningen kunnen dan helpen.



Bewegingsprogramma bij kanker

oncologisch bewegingsprogramma, oncologische revalidatie, oncorevalidatie

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je lichaam. Met ons bewegingsprogramma helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen.



Bijnierchirurgie



Billift

Ook wel adrenalectomie genoemd. De arts verwijdert operatief één of beide bijnieren. Je bijnieren zorgen voor een goede bloeddruk en produceren verschillende hormonen.

gluteale lift

Bij een billift wordt de overtollige huid ter hoogte van de billen aangespannen. We kunnen ook het volume van de bil vergroten met je lichaamseigen vetweefsel.



Biologicals en biosimilars

Biologicals zijn medicijnen die heel specifieke signaaleiwitten uitschakelen en zo ziekteprocessen (zoals reumatoïde artritis, psoriasis of inflammatoire darmziekten) beïnvloeden.



Blaassonde

blaaskatheter

Er bestaan twee soorten blaassondes. Een transurethrale blaassonde wordt via je plasbuis in je blaas ingebracht. Bij een suprapubische blaassonde gebeurt dat via je buikwand.



Blaasspoeling

blaasinstillatie, blaasspoeling met *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG), BCG-spoeling, BCG-instillatie, blaasspoeling met Epirubicine, Epirubicine-spoeling, Epirubicine-instillatie

Om te verhinderen dat blaaspoliepen terugkomen of verergeren, krijg je medicijnen toegediend in je blaas. De uroloog bepaalt hoeveel blaasspoelingen in jouw geval nodig zijn.



Blaasverwijdering

wegname blaas, radicale cystectomie met Bricker urostoma of neoblaas, robot geassisteerde radicale cystectomie, RARC

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog je blaas weg en zorgt ervoor dat de urine kan afvloeien via een urostoma of een nieuwe blaas.



Bloedtransfusie

Bij een bloedtransfusie krijg je via een infuus bloed van een donor toegediend. Dat kunnen rode bloedcellen (erythrocyten), bloedplaatjes (trombocyten) of plasma zijn.



Bloedtransfusie bij kinderen

Als je kind te weinig bloed heeft, kan het een bloedtransfusie krijgen. Gezond donorbloed wordt dan via een infuus toegediend. De huid wordt vaak verdoofd voor de prik.



Borstlift



Borstvergroting

mastopexie

Bij een borstlift herstellen we de positie en vorm van de afhangende borst. We verwijderen overtollige huid, liften de tepel en herschikken het borstweefsel tot een stevigere vorm.

borstaugmentatie, augmentatieve mammoplastiek

Bij een borstvergroting vergroten we het volume van je borsten. Hiervoor gebruiken we je eigen vetweefsel of een silicone prothese of implantaat.



Borstvergroting (chirurgische genderzorg)

chest wall contouring (CWW) vervrouwelijking, chest wall contouring feminisatie borstvergroting, borstaugmentatie, augmentatieve mammoplastiek

In het zorgproces kan je kiezen voor een borstvergroting. De plastisch chirurg vergroot dan de grootte en vorm van de borsten.



Borstverkleining

borstreductie

Te zware of hangende borsten veroorzaken soms problemen zoals nek- en rugpijn, of ongemakken bij het sporten. Je borsten operatief laten verkleinen kan dan een oplossing zijn.



Borstverwijdering (chirurgische genderzorg)

chest wall contouring (CWW) vermannelijking, chest wall contouring (CWW) masculinisatie, wegname borstklierweefsel

In het zorgproces kan je ervoor kiezen om borstklierweefsel te laten wegnemen. De huid, tepel en tepelhof of een deel ervan blijven behouden.



Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.



Botoxbehandeling bij neurologische aandoeningen

inspuiting met botox

We spuiten een kleine hoeveelheid botulinumtoxine of botox in bepaalde spieren in. Dat zorgt ervoor dat de zenuwen geen signaal naar die spieren sturen. Ze worden



Botoxbehandeling uit esthetische overwegingen

Botulinetoxine is een stof die we gebruiken om je gezichtsspieren te ontspannen en dynamische rimpels zoals fronslijntjes of kraaienpootjes tijdelijk minder zichtbaar te maken.

verlamd.



Botuline-injecties

botulinebehandeling

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



Buikwandchirurgie

Een operatie aan je buik om bijvoorbeeld een buikwandbreuk, liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk te behandelen.



Buikwandcorrectie

abdominoplastie

Door zwangerschap of een gewichtsschommeling kan je buikwand verslappen. Met deze ingreep corrigeren we de huid, het onderhuids vetweefsel en de verslapte spieren.



Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



Cardiale revalidatie

hartrevalidatie

Een belangrijk onderdeel van het herstelproces na een hartziekte. Je krijgt na een behandeling of operatie een persoonlijk revalidatieschema.



Cardioversie

De arts geeft je hart een 'reset'. Door een elektrische schok toe te dienen, stopt het abnormale hartritme en gaat het over naar een normaal ritme.



Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglens en vervangen ze door een



Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige aanwassen rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.

heldere implantlens in kunststof. Die gaat in

je leven mee.



Chemotherapie

behandeling met cytostatica of cytotoxische middelen

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen die de groei van kankercellen afremmen of de celdeling verstoren.



Chirurgie bij huidziekten

Chirurgie is het wegsnijden van een stukje huid of gezwel. Dit doen we onder lokale verdoving. De huid wordt terug afgesloten met hechtingen.



Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in de galweg.



Chronisch nierlijden zorgtraject

Samen met je huisarts doen we ons best om te vermijden dat je nieren verder verslechteren. We proberen te voorkomen dat je in een ernstige fase van nierfalen terechtkomt.



Correctie afhangend bovenooglid

ptosiscorrectie

Tijdens een ptosiscorrectie verbetert de oogarts de spier die verantwoordelijk is voor het openen van je bovenste ooglid, waardoor het ooglid minder over het oog zakt.



Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.



Correctie naar binnen geklapt ooglid

entropioncorrectie

Met een entropioncorrectie corrigeert de oogarts een naar binnen geklapt ooglid.



Correctie naar buiten hangend ooglid

ectropioncorrectie

Met een ectropioncorrectie corrigeert de oogarts een naar buiten hangend ooglid.



Corticosteroïden

cortisonen

Corticosteroïden zijn een synthetische variant van het bijnierschors hormoon. Ze onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam.



CPAP-therapie

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), CPAP-behandeling, CPAP-masker, slaapapneumasker, continue positieve luchtwegdruk, positievedrukmasker

CPAP is een apparaat dat verbonden is met een masker dat je op je gezicht plaatst als je slaapt. Het blaast continu kamerlucht in je keel en luchtwegen zodat je normaal kan ademen.



Cryotherapie

Met Cryotherapie behandelen we huidaandoeningen door middel van bevriezing.



Defibrillator

Een apparaat dat je hartritme voortdurend bewaakt en optreedt bij abnormale hartritmestoes. Het zorgt ervoor dat het hart na een hartritmestoes weer normaal gaat werken.



Dementiezorg voor ouderen

Voor dementie bestaat er momenteel geen genezende behandeling. We kunnen wel proberen het verstandelijk verlies en het verlies aan zelfredzaamheid tijdelijk te vertragen.



Dento-alveolaire chirurgie

orale chirurgie, stomatologie

Dento-alveolaire chirurgie zijn chirurgische ingrepen van de boven- en onderkaak, bij de tanden en kiezen.



Desensibilisatietherapie voor huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat je veel minder allergisch reageert.



Desensibilisatietherapie voor insectengif

desensibilisatietherapie voor wespen- en bijengif

Je krijgt meermaals een lage dosis wespen- of bijengif toegediend. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat je veel minder allergisch reageert.



Diabeteszorg

Op de dienst Endocrinologie kan je terecht voor de opvolging van zowel diabetes type 1 als type 2 en zwangerschapsdiabetes.



Diagnose en opvolging geheugenproblemen

Dit zorgpad laat toe om onzekerheden weg te nemen, een eenvoudige screening uit te voeren en tijdig in te grijpen op corrigeerbare geheugenklachten.



Dialyse

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet dialyse. Er zijn verschillende vormen van dialyse.



Dieet bij brandwonden

Brandwonden zorgen voor een verhoogde stofwisseling en vochtverlies via de beschadigde huid. Een verhoogde energie- en vochtinname is daarom belangrijk.



Dijlift

Een dijlift is een ingreep om huid- en vetoverschot aan de dijen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.



Dilatatie

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).



Duple arthrodese

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven bewegen.



Doelgerichte therapie

doelgerichte medicijnen, targeted therapy

Doelgerichte geneesmiddelen werken in op specifieke eigenschappen van de kankercellen. Ze blokkeren bepaalde processen die leiden tot celdeling.



DRUJ prothese



Dringende psychiatrische zorg voor volwassenen

crisiszorg psychiatrie, urgentiepsychiatrie, crisisinterventie psychiatrie, dringende psychiatrische zorg

We richten ons op volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. Welke zorgvorm binnen de crisishulp het meest aangewezen is, wordt bepaald via een



Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.



Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie geven we je een injectie terwijl we een echografie uitvoeren. Zo kunnen we de naald gericht sturen en zien we beter waar de medicatie terecht komt.



Elektrocoagulatie

Bij elektrocoagulatie branden we huidweefsel weg. Dit gebeurt onder verdoving.

Distal Radioulnar Joint prothese

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



Duodenal switch

Deze ingreep is een verbeterde versie van de scopinano, een operatie die veel werd uitgevoerd in de jaren '80 en '90.



Eicellen invriezen bij gendertransitie

eicelbanking, eicelpreservatie, eicelvitificatie, social egg freezing, fertiliteitspreservatie, vruchtbaarheidspreservatie, vruchtbaarheidsbescherming

Voor de start van de hormoontherapie of ingreep kan je ervoor kiezen om eicellen te laten invriezen. Zo behoud je de optie om nog eigen biologische kinderen te krijgen.



Elleboogprothese

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.



Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het slechte weefsel weg te nemen.



Endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)

vermageringsoperatie

Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen. Er zijn bijna geen complicaties, omdat de chirurg geen stukje maag wegneemt.



Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine instrumenten in via een endoscoop.



Endovasculair aneurysma

EVAR, endovasculair herstel

In het geval van een aneurysma plaatst de chirurg een kunststofbuis aan de binnenkant van het bloedvat om dit te herstellen. Je klachten verdwijnen hierna vrij snel.



Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.



Epidurale infiltratie

interventionele pijnbehandeling

De pijnarts plaatst na lokale verdoving een fijne naald tot in de ruimte rond je ruggenmerg en de zenuwwortels die daaruit ontstaan en spuit daar pijnstillende medicatie in.



Epidurale verdoving

epidurale ruggenprik, epidurale anesthesie, peridurale analgesie

Met een epidurale ruggenprik blokkeert de anesthesist tijdelijk de doorstroming van pijnprikkels naar de hersenen.



Epidurale verdoving bij bevalling

epidurale ruggenprik, peridurale analgesie bij bevalling, epidurale anesthesie

De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en de bevalling is de epidurale verdoving of ruggenprik.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.



Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



Ergotherapie bij brandwonden

Om je zelfstandigheid en de beweegbaarheid te behouden of te verbeteren, zetten we in op ergotherapie. De ergotherapeut start al in het ziekenhuis met oefeningen.



Facelift

Een facelift is een ingreep die de tekenen van veroudering aan je gezicht en hals vermindert. Via een snee voor het oor spannen we de huid en onderliggende weefsellaag aan.



Facetbehandeling

De pijnarts stelt een facetbehandeling voor als die vermoedt dat je pijnklachten hun oorsprong vinden in je facetgewrichten. Dat zijn kleine zijgewrichtjes tussen je wervels.



Fysiotherapie bij brandwonden

Met oefeningen zorgt de kinesist ervoor dat de verbrande ledematen blijven functioneren, zodat je terug zelfstandig kan leven.



Galblaas- en galwegenchirurgie

glasblaasoperatie, galwegenoperatie, cholecystectomie

Een operatie aan je galblaas of galwegen waarbij de chirurg pijnlijke galstenen verwijdt



Gastric banding

maagband



Gastric bypass

maagbypass, vermageringsoperatie

Tijdens deze ingreep plaatst de chirurg een verstelbare maagband rond de bovenkant van de maag.

De chirurg verkleint je maag en leidt je twaalfvingerige darm en een deel van de dunne darm om. Je kan daardoor veel minder eten en hebt langer een verzadigd gevoel.



Gedeeltelijke verdoving

Bij een gedeeltelijke verdoving maakt de anesthesist een bepaald deel van je lichaam gevoelloos of bewegingloos.



Genderbevestigende hormoontherapie

Deze therapie met medicijnen zorgt ervoor dat de beleefde genderidentiteit aansluit bij de identiteit van de persoon die de medicijnen neemt.



Gewrichtsprothese

Bij een gewrichtsprothese vervangen we je gewricht door een kunstgewricht. Mogelijke oorzaken zijn slijtage, een breuk, een aangeboren afwijking of het afsterven van het gewricht.



Glaucoomoperatie

glaucoomchirurgie

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.



Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Hallux is Latijn voor grote teen. Hallux-chirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



Halslift

Een halslift is een ingreep om de huid ter hoogte van de hals strakker te maken en overtollig vet te verwijderen. Dit kan in combinatie met een facelift.



Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP, unicondylaire prothese



Handrevalidatie

Bij een handprobleem zoals een breuk, reuma, een peesontsteking, een amputatie of een ziekte helpen we je om je hand opnieuw

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen, niet het hele kniegewricht.

te leren gebruiken. We geven ook tips over ergonomie.



Hartklepoperatie

hartoperatie

Om een lekkende of vernauwde hartklep te vervangen of repareren. Deze operatie gebeurt meestal via een kijkoperatie.



Hartmedicatie

Om een hartziekte te behandelen of te voorkomen, schrijft de arts vaak medicatie voor. Er is o.a. bloeddrukverlagende, bloedverdunnende en cholesterolverlagende medicatie.



Hartmonitor

Een implantatie om de oorzaak van hartritmestoornissen of flauwvallen op te sporen. Het apparaat, ook wel 'implanteerbare looprecorder' genoemd, registreert elke hartritmestoornis.



Hartrevalidatie

cardiale revalidatie, cardiologische revalidatie

Bij cardiologische revalidatie leer je oefeningen om de conditie van je hart weer op te bouwen na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie.



Hemodialyse

Bij hemodialyse leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren. Meestal zijn er wekelijks 3 dialysesessies van elk 4 uur nodig.



HIPEC-chirurgie (Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie)

Een combinatie van chirurgie en chemotherapie om één of meerdere tumoren uit je buikholte te verwijderen.



Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie

Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.



Hormoonremming bij kinderen en jongeren

Puberteitsremmers onderdrukken de productie van geslachtshormonen. Ze remmen lichamelijke veranderingen die gelinkt zijn aan het geboortegeslacht.



Hormoonremming bij volwassenen

Bij volwassen personen die bij de geboorte het mannelijk geslacht hebben toegewezen gekregen, onderdrukt hormoonremming het mannelijk hormoon (testosteron).



HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



Huidtumor verwijderen

Je kan bij de plastisch chirurg terecht voor het verwijderen van goedaardige en kwaadaardige huidletsels, zowel om medische als esthetische redenen.



Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is een therapie die we inzetten om zuurstoftekort in beschadigde weefsels te herstellen.



Hysterectomie

baarmoederverwijdering, baarmoeder weghalen

Een hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de arts de baarmoeder geheel of gedeeltelijk wegneemt.



Immunotherapie

immuuntherapie

Bij immunotherapie wordt je immuunsysteem met geneesmiddelen aangepast of versterkt om kankercellen te bestrijden en te vernietigen.



Immunotherapie bij bloedkankers

immuuntherapie bij bloedkankers

Immunotherapie stimuleert je afweersysteem om kankercellen op te ruimen. Je krijgt afweercellen toegediend die 'getraind' zijn om kankercellen te herkennen en te vernietigen.



Infiltratie

Infiltratie is een techniek waarbij een naald tot de bron van de pijn gaat. Daarna spuiten we een medicijn, ontstekingsremmer of pijnstiller in. Dit kan je klachten verminderen.



Infiltraties bij het carpaletunnelsyndroom

inspuiting met ontstekingsremmers

Het carpaletunnelsyndroom omvat klachten in de hand en onderarm. We spuiten ontstekingsremmers in de pols om ontsteking en druk op de zenuw te verminderen.



Infiltraties bij occipitalisneuralgie

inspuiting met ontstekingsremmers

Occipitalisneuralgie is een ziekte waarbij de zenuwen in de nek en achterkant van het hoofd ontstoken raken. We spuiten ontstekingsremmers rond de zenuw om pijn te verlichten.



Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheelkunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



Infiltraties (van gewrichten)

inspuiting, gewrichtspunctie

Een infiltratie is een lokale behandeling waarbij we vocht uit een gewricht halen en er medicatie inspuiten.



Infiltraties bij meralgia paresthetica

inspuiting met ontstekingsremmers

Meralgia paresthetica is een beknelde zenuw in het bovenbeen. We spuiten ontstekingsremmers rond de heupkam om pijn te verlichten.



Infuustherapie

infuusbehandeling

Bij een tekort aan bijvoorbeeld ijzer, vitamines of immunoglobuline kan je hematoloog voorstellen om die stoffen toe te dienen via een infuus.



Ingrepen op de aorta

hartoperatie

Om problemen aan de aorta te behandelen, voert de arts een bentalloperatie, ingrepen aan de aorta ascendens en ingrepen op de aorta descendens uit.



Inhalatietherapie

Bij deze therapie adem je medicijnen in via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten.



Interventionele pijnbehandeling

interventionele pijntherapie, interventionele pijnbestrijding

Bij een interventionele pijnbehandeling richt de pijnarts zich op de zenuw die de pijnsignalen doorgeeft naar je hersenen.



Intrathecale pijnpomp

intrathecale pijntherapie, intrathecale morfinepomp

Bij deze behandeling krijg je via een pijnpomp medicijnen toegediend in de intrathecale ruimte. Dat is de ruimte rond je ruggenmerg waar ruggenmergvocht in zit.



Inwendige en uitwendige neuscorrectie

septorhinoplastie

Bij een in- en uitwendige neuscorrectie veranderen we de vorm van je neus om de functie en/of het uitzicht van je neus te verbeteren.



Katheters en poortkatheters plaatsen

Een katheter is een buisje dat we rechtstreeks in een ader inbrengen om medicatie toe te dienen of om bloed af te nemen.



Kijkoperatie borstkas

video-assisted thoracoscopic surgery, video-assisted thoracic surgery, VATS

Deze kijkoperatie is op dit moment de meest gebruikte techniek. Onder volledige verdoving (narcose) maakt de chirurg 1, 2 of 3 kleine sneetjes in de borstkasholte.



Kijkoperatie hogere urinewegen

ureterorenoscopie, URS, flexibele of rigide uretero(reno)scopie, RIRS

Met een ureterorenoscopie kan de uroloog stenen of poliepen in je urinewegen of nier behandelen.



Kijkoperatie keel en strottenhoofd

pandendoscopie

Met een soort buis (scoop) bekijkt de arts je mond- en keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en slokdarm. Het doel is om verdachte weefsels op te sporen en te laten onderzoeken.



Kijkoperatie op het hart

hartoperatie

De arts opereert je hart via kleine gaatjes in plaats van 1 grote snee. Dankzij een fijne HD-camera ziet de chirurg het hart op een groot scherm.



Kinesithherapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



Kinesithherapie rond de bevalling

perinatale kinesithherapie, prenatale kinesithherapie, postnatale kinesithherapie

Met kinesithherapie maak je de spieren van je bekkenbodem weer sterker na een bevalling of bereid je je voor op de bevalling met oefeningen en ademhalingstechnieken.



Klassieke reumamedicatie

Klassieke reumamedicatie onderdrukt gewrichtsontstekingen.



Klinische studies Hematologie

Je hematoloog kan je voorstellen om deel te nemen aan een klinische studie. Het doel daarvan is nieuwe medicijnen of nieuwe combinaties van medicijnen uittesten.



Klinische studies Oncologie

experimentele kankerbehandeling, trial

Klinische studies vormen de basis van de medische vooruitgang. Ze onderzoeken nieuwe behandelingen of nieuwe combinaties van behandelingen en hun werkingsmechanisme.



Knieprothese op maat

maatprothese

Een knieprothese is een kunstknie. Bij een maatprothese wordt op basis van een scan gekeken hoe de prothese best gepositioneerd wordt volgens jouw specifieke anatomie.



Kortdurende psychiatrische zorg voor volwassenen

kortdurige psychiatrische zorg, acute psychiatrische zorg

We behandelen volwassenen met diverse psychische klachten. Zo stellen we samen een zorgprogramma op maat op waarin we

zowel individueel als in groep aan de slag



Langdurige psychiatrische zorg voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)

langdurige psychiatrische zorg

Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening die voor een langere periode nood hebben aan een intensieve begeleiding kunnen in ons langdurige zorgtraject terecht.



Laserbehandeling voor oogandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.



Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het schouderblad.



Ligamenten vastzetten

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduum, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



Liposuctie

liposculptuur, vetverwijdering

Bij een liposuctie verwijderen we onderhuids vet door het weg te zuigen. Zo verminderen we lokaal opgestapeld vet.



Littekenbehandeling bij brandwonden

Voor de medische en emotionele opvolging van littekens kan je terecht bij OSCARE, een nazorgcentrum voor brandwonden en littekens.



Littekencorrectie

Een operatie waarbij de chirurg het huidige litteken uitsnijdt en de opening opnieuw aan elkaar hecht.



Logopedie

De logopedist helpt je om goed te leren spreken, kauwen en slikken, bijvoorbeeld



Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.

wanneer je herstelt van een neurologische



Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.



Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.



Maagchirurgie

Een operatie aan je maag om bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren in je maag te verwijderen.



Maagsonde

Een maagsonde is een kunststof buisje dat via de neus of uitzonderlijk via de mond naar de slokdarm tot in de maag geplaatst wordt.



Maagverkleining maagpouch via slokdarm

Ook wel Transoral Outlet Reduction (TORe) genoemd.



Maagverkleining via de slokdarm

Ook endoscopische sleeve gastroplastiek of ESG genoemd. Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen.



Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



Medicamenteuze behandeling

Bij een medicamenteuze behandeling krijg je een voorschrift op maat van de aandoening voor het te behandelen probleem.



Microscopische discectomie

discotomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw aandrukt. De arts verwijdt de schijf om de druk te verlichten.



Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning

Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning van vitale functies en parameters (temperatuur, bloeddruk ...) om zo complicaties te voorkomen door snel in te grijpen.



Netvliesoperatie

achtersegmentoperatie, vitreoretinale chirurgie, vitrectomie

Bij een vitrectomie halen we het glasvocht uit je oogbol en vervangen het door oogvocht, gas of olie.



Neurostimulatie



Medicatie voor reuma

De behandeling van reumatische aandoeningen is afhankelijk van het type reuma en van de patiënt zelf.



Middenoorinspectie

We bekijken en controleren de beweeglijkheid van de gehoorbeentjes en proberen je gehoor te verbeteren. Als er een gaatje in je trommelvlies zit, maken we dat ook dicht.



Nazorg bij brandwonden

Brandwonden moeten ook na de ziekenhuisopname medisch opgevolgd en behandeld worden. Die opvolging bestaat uit een dagelijkse verzorging tot aangepaste therapie.



Neurologische revalidatie

Neurorevalidatie

Bij een aandoening aan je hersenen, zenuwstelsel of ruggenmerg helpen we je om je functies te herstellen of om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan.



Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

ruggenmergstimulatie, spinal cord stimulation (SCS), zenuwwortelstimulatie, dorsal root ganglion (DRG)

Een neurostimulator geeft via elektroden op je huid lichte elektrische impulsen in de ruimte rond je ruggenmerg en onderbreekt zo de pijnsignalen tussen je ruggenmerg en hersenen.

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



Neuscorrectie

rhinoplastiek

Met een neuscorrectie wijzigen we de vorm of grootte van de neus. Dat gebeurt om esthetische redenen, maar soms ook om ademhalingsproblemen te verhelpen.



Neustussenschotcorrectie

septumcorrectie, septoplastie

Het neustussenschot (septum) verdeelt je neus in 2 holtes. Bij een neustussenschotcorrectie zetten we het opnieuw recht zodat je weer beter door je neus kan ademen.



Nierdrain

nefrostomiekatheter (NSK), percutane nefrostomie (PCN), nefrodrain

Als je urineleider verstopt is, plaatsen we via een klein aanprikgaatje in je flank een drain (slangetje) in je nier. Die drain zorgt ervoor dat de urine uit je nier kan afvloeien.



Niersteenpreventie

Om niersteenvorming te voorkomen geven we je richtlijnen over hoeveel je best drinkt en wat je wel/niet eet. Ook kunnen we soms preventieve medicatie opstarten.



Niersteenverwijdering door de huid

percutane niersteenverwijdering, percutane nefrolitholapaxie (PNL), PCNL, nefrolithotomie

Met een naald prikt de uroloog door je huid je nier aan. Via een hol buisje worden daarna de nierstenen weggenomen.



Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier. Uw arts beoordeelt of u in aanmerking komt en volgt u nadien op. De ingreep gebeurt in een Belgisch transplantatiecentrum.



Nierverwijdering



Niet-invasieve beademing

verwijdering of wegname nier of een gedeelte ervan, verwijdering niergezwel of niertumor, partiële of radicale nefrectomie, robot geassisteerde partiële nefrectomie, RAPN

Bij een (partiële) nefrectomie neemt de uroloog (een deel van) je nier weg. Soms wordt ook de urineleider weggenomen, in dat geval spreken we over een nefro-ureterectomie.

niet-invasieve ventilatie, thuisventilatie, non-invasieve ventilatie, NIV

Bij sommige aandoeningen is je lichaam niet meer in staat om op een juiste manier zuurstof op te nemen en koolzuur uit te ademen. Een thuisbehandeling kan mogelijk aangewezen zijn.



Omega loop gastric bypass

Ook wel mini gastric bypass of single anastomose bypass genoemd. Het is een vereenvoudigde (mini-)versie van de gastric bypass.



Oncologische slokdarmheelkunde

Een operatie aan je slokdarm om kwaadaardige tumoren in je slokdarm te verwijderen.



Ontstekingsremmende pijnstillers bij reuma

NSAID's (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs)

Ontstekingsremmende pijnstillers zijn geneesmiddelen die ontstekingen verminderen en pijn verlichten.



Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochtruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht (vitreum) van het oog om bepaalde netvliesandoeningen te behandelen.



Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, bipten genomen van letsels in de oogkas of tumoren verwijderd.



Ooglidcorrectie

dermatochalasiscorrectie, blefaroplastie

Tijdens een ooglidcorrectie neemt de oogarts of plastisch chirurg overtollige huid en/of vet van de bovenste en/of onderste oogleden weg.



Ooglidoperatie

oogldingreep

Er zijn oogldingrepen om esthetische redenen (om je ogen er jonger en frisser te laten uitzien) en om medische redenen, bijvoorbeeld omdat een ooglid je gezichtsvermogen hindert.



Openen smalle bloedvaten

Om een versmalling in de bloedvaten weer open te krijgen werkt de chirurg met een ballonnetje. Als dat niet of nauwelijks werkt, kan er een metalen buisje (stent) geplaatst worden.



Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



Operatie bij hallux rigidus

operatie teenartrose, stijve grote teen opereren

Deze ingreep kan je laten uitvoeren wanneer je grote teen stijf is omdat het kraakbeen in het gewricht versleten is.



Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dichterbij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd worden.



Operatie aan je lever

Je lever maakt gal, stollingsfactoren en eiwitten aan. Het zet ook voedingsstoffen om naar energie.



Operatie bij endeldarm- of rectumkanker

De chirurg verwijdert operatief je endeldarm en het omliggende weefsel. Als de kwaadaardige tumoren naast je sluitspier liggen, dan neemt de arts ook je sluitspier en je anus weg.



Operatie bij hallux valgus

hallux-valgus-operatie, operatie scheve grote teen

Een hallux-valgus-operatie is een ingreep die je kan laten uitvoeren als je grote teen scheef staat en pijnlijk is. De arts zet dan de botten van je teen weer recht.



Operatie carpaletunnelsyndroom



Operatie borstkas (open heekunde)

Thoracotomie

Bij een thoracotomie maken artsen de borstkas open tussen de ribben, een

kleine toegang voor de behandeling van



Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



Operatie tegen snurken en slaapapneu

uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Bij deze operatie verkleinen we het zachte gehemelte. In het geval van slaapapneu nemen we ook je keelamandelen weg.



Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



Operatie van een ingegroeide teennagel

De chirurg behandelt en verwijdert operatief de ingegroeide teennagel.



Opvolging gebruik verschillende medicijnen bij ouderen

opvolging polyfarmacie bij ouderen

De geriater bekijkt in overleg met de klinisch apotheker de medicatielijst van de patiënt en



Opvolging na niertransplantatie

Na uw transplantatie volgen we u op, controleren uw transplantnier en regelen uw medicatie. Stipte medicatie inname en een gezonde levensstijl blijven essentieel.



Opvolging ouderen met kanker

zorgpad Oncologie – Geriatrie

Via dit zorgpad doen we bij ouderen met kanker een geriatrische evaluatie en koppelen die terug naar de behandelend oncoloog of orgaanspecialist.



Opvolging vermagering en slikproblemen bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van slikproblemen en vermagering te achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.



Orthese

Een orthese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel beschermt of ondersteunt,



Opvolging incontinentie bij ouderen

In het geriatrisch dagziekenhuis proberen we te achterhalen hoe het komt dat je ongewild urine of stoelgang verliest en stippelen we



Opvolging ouderen met hartfalen

zorgpad Cardiologie – Geriatrie

Via dit zorgpad kunnen we ouderen met hartfalen op een ambulante manier medisch deskundig behandelen.



Opvolging valrisico en spierverlies bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van het verhoogde valrisico en het spierverlies te achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.



Orchidopexie bij volwassenen

behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal, behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde testis, behandeling niet-scrotale testis, behandeling cryptorchidie

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de uroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Orthopedische revalidatie

Tijdens dit oefenprogramma bouwen we je kracht op, vergroten we de beweeglijkheid

zoals een korset of steunzolen. Het is niet hetzelfde als een prothese, dat een lichaamsdeel vervangt.

van je gewricht en verbeteren we de stabiliteit van het gewricht en lichaam.



Osteotomie van de kaak

kaakcorrectie

Bij een osteotomie verplaatsen we de boven- en/of onderkaak om bijvoorbeeld een verkeerde beet te corrigeren. Dit omvat ook esthetische profielcorrecties.



Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



Overbruggingsoperatie of bypassoperatie

hartoperatie

De arts legt overbruggingen met 1 of 2 borstslagaders en/of een ader uit het been als de kransslagaders ernstig vernauwd zijn.



Pacemaker

Een apparaat dat je hart altijd bewaakt. Als er een abnormaal hartritme optreedt, dan grijpt de pacemaker in door je hart een elektrische prikkel te geven.



Parkinsonrevalidatie

Door de ziekte van Parkinson sterven er zenuwcellen af. Hierdoor kan je minder goed bewegen. Met Parkinsonrevalidatie leren andere, gezonde zenuwcellen om functies over te nemen.



PDT

Photodynamische therapie (PDT) is een behandeling waarbij we een lichtgevoelige crème op de huid aanbrengen en activeren met een rode lamp.



Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet



Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met

goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.

een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



Peritoneale dialyse

buikspoeling

Bij peritoneale dialyse wordt via een katheter in je buik spoelvoeistof in de buikholtte gebracht. Peritoneale dialyse gebeurt dagelijks en kan zowel 's nachts als overdag.



Pijnbehandeling sacro-iliacaal gewricht

De pijnarts injecteert een kleine hoeveelheid verdovingsmiddel in je heiligbeengewricht (infiltratie) en behandelt het met radiofrequente stroom (RF-denervatie).



Pijnbehandeling zonder medicijnen

niet-medicamenteuze pijnbehandeling

Er bestaan tal van behandelingen die je pijn kunnen helpen verlichten. Bespreek met je arts wat bij jou veilig is en mogelijk pijnverzachtend.



Pijnbeleid bij kinderen

ZAS doet er alles aan om pijn, angst en stress bij je kind te voorkomen en verzachten.



Pijnmedicatie

pijnmedicijnen, medicamenteuze of farmacologische pijnbehandeling of pijnbestrijding

Pijnmedicijnen kunnen je pijn verlichten of onderdrukken. Het is belangrijk ze juist te gebruiken: in de juiste dosis, juiste combinatie en juiste vorm.



Pijnstilling na operatie

Een goede pijnbehandeling na de operatie draagt ertoe bij dat er zich minder complicaties voordoen, dat je je comfortabeler voelt en dat je sneller herstelt.



PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en plaatst een metalen pinnetje of een schroefje.



PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwtvormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwtvormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



Plaatsen van een implantaat

plaatsen titanium schroefje

Na het verlies van een of meerdere tanden kan er een implantaat (titanium schroefje) geplaatst worden in het kaakbot. Daarop zet de tandarts een kroon, brug of kunstgebit.



Plaatsing JJ-stent

plaatsing dubbel J-stent, plaatsing ureterstent

Een dubbel-J-stent is een dun slangetje met aan de twee uiteinden een krul. In de twee krullen zitten gaatjes om de afloop van urine van de nier naar de blaas te bevorderen.



Plaatsing kunstlens

implantatie kunstlens, refractieve lensimplantatie, refractieve lenschirurgie

Tijdens deze ingreep vervangen we je natuurlijke ooglenzen door een implantlens in kunststof of plaatsen we een bijkomende corrigerende implantlens.



Plaatsingsdossier en D-bilan voor ouderen

We brengen je zorgvraag in kaart en vullen het formulier indicatiestelling in. Dat heb je nodig bij een opname in een woonzorgcentrum of om bepaalde terugbetalingen aan te vragen.



POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.



Polsprothese

Bij een polsprothese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is. Na de ingreep kan je minder, maar nog voldoende bewegen.



Predialyse

Als uw nierfunctie ernstig verminderd is bekijken we samen de mogelijke opties van nierfunctievervangende therapie. Je krijgt uitgebreide info over alle behandelingsopties.



Preventie huisstofmijt

Dermatophagoides pteronyssinus, stofmijt

De huisstofmijt is een van de meest voorkomende bronnen van allergie, ook bij kinderen. Met deze tips en voorbereiding maak je je huis zo huisstofmijtvrij mogelijk.



Preventie voedselallergie bij kinderen

allergiepreventie, voedingsallergie

In de preventiepoli maken we jonge kinderen vertrouwd met bepaalde voedingsstoffen. Zo verkleinen we de kans op een voedselallergie.



Prostaatoperatie via plasbuis

transurethrale resectie prostaat, TUR prostaat, TURP

Bij die ingreep neemt de uroloog het prostaatweefsel weg dat de plasbuis dichtdrukt. Dat gebeurt via een kijkinstrument dat de uroloog inbrengt in de plasbuis.



Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.



Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



Psychiatrische ondersteuning voor gehospitaliseerde volwassenen

liaisonpsychiatrie

Bij liaisonpsychiatrie schenken we zowel aandacht aan je mentale gezondheid als aan eventuele lichamelijke gezondheidsproblemen.



Psychosezorg voor volwassenen

Onze psychosezorg-diensten bieden veiligheid en structuur. Naast het klinische herstel (verbeteren van symptomen) schenken we aandacht aan je persoonlijke herstel.



Pyleoplastie bij volwassenen

pyeloplastiek, behandeling vernauwing tussen nierbekken en urineleider

Tijdens een pyleoplastie neemt de uroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Radiotherapie

bestraling

Radiotherapie maakt gebruik van verschillende soorten stralen om kankercellen te doden of ervoor te zorgen dat ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.



Reconstructie voorste kruisband

Voorstekruisbandoperatie, operatie gescheurde kruisband, voorste kruisbandreconstructie, VBK

Bij deze operatie krijg je een nieuwe voorste kruisband in je knie, gemaakt uit andere pezen van je lichaam.



Reconstructieve chirurgie

Met deze chirurgie herstellen we een chronische wonde of een lichaamsdeel dat afwezig of vervormd is. Het probleem kan aangeboren zijn of het gevolg van een ongeval of ziekte.



Redo-chirurgie

Aanpassingen van eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperaties.



Redo-operatie

redo-chirurgie, heringrepen

Een redo-operatie is een aanpassing van een eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperatie.



Reisvaccinatie bij kinderen

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Ook kinderen kunnen gevaccineerd worden. Vraag je kinderarts om meer informatie.



Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



Revalidatie na amputatie

Na een amputatie helpt een multidisciplinair team je om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om te gaan met het letsel en eventueel te wennen aan je prothese - als je er een hebt.



Revalidatie na een niet aangeboren neurologische aandoening (NAH)

NAH-revalidatie

Een hersenletsel kan plots ontstaan, bijvoorbeeld na een ongeval, beroerte of ziekte. Bij je revalidatie streven we naar herstel en helpen we je om te gaan met de beperkingen.



Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.



Revalidatie na bloedkanker

sport na een hematologische maligniteit

We hebben een bewegingsprogramma voor patiënten die herstellen van een kwaadaardige bloedziekte. De oefeningen helpen patiënten om zich beter, sterker en minder vermoeid te voelen.



Revalidatie na stamceltransplantatie

Na een stamceltransplantatie nodigen we je uit om in ZAS Cadix deel te nemen aan het revalidatieprogramma 'In Balans'.



Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Robotchirurgie voor het plaatsen van een prothese

ROSA-robot, RObotic Surgical Assistant, operatierobot, robotgeassisteerde prothese

De ROSA-robot is een navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij het plaatsen van een prothese.



RSV-preventie

Je kan je baby beschermen tegen het RSV-virus met een inspuiting die wordt terugbetaald door de mutualiteit, of door je als moeder te laten vaccineren tijdens de zwangerschap.



Rugrevalidatie

behandeling van rugpijn

Rugrevalidatie is een vorm van ondersteuning bij terugkerende rugklachten. We trainen je spieren en leren je over ergonomie. We tonen je ook hoe je met de pijn kan omgaan.



Scaphoidectomie

Bij een scaphoidectomie verwijdert de arts het os scaphoideum. Dat is een van de acht kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



Schaamlipcorrectie

labiaplastie

Bij sommige vrouwen zijn de kleine schaamlippen groter dan de buitenste. Dit kan ongemakken of onzekerheid veroorzaken. We kunnen dit corrigeren, vaak onder lokale verdoving.



Scheelzienoperatie bij volwassenen

strabismechirurgie, strabisme-operatie, oogspieroperatie

We verzwakken of versterken de oogspieren die aan de buitenkant van je oogbol vastzitten door ze te verplaatsen of in te korten. Zo kunnen we de stand van je ogen corrigeren.



Schildklieroperatie

schildklierchirurgie, thyroïdectomie, wegname schildklier, verwijdering schildklier, schildklieringreep

Een operatie waarbij de arts je schildklier gedeeltelijk of volledig verwijdert. Je schildklier is een orgaan vooraan in je hals en



Schouderprothese

kunstschouder, schouderimplantaat

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.

zorgt voor de productie van hormonen in je bloed



Schouderrevalidatie

Na een operatie of blessure aan je schouder is het belangrijk om goed herstellen. Tijdens dit traject leren we je om je schouder te ontlasten en nadien weer correct te gebruiken.



Sedatie

Met geneesmiddelen verlagen we je bewustzijn zodanig dat je een operatie of onderzoek niet als onaangenaam ervaart of er zelfs niets van merkt.



Shockwavetherapie

ESWT, shockwave, extracorporeal shockwave therapy, schokgolfterapie

ESWT of shockwavetherapie is een behandeling waarbij we met een apparaatje een schokgolf door een pees sturen. Hierdoor wordt die pees gestimuleerd om zichzelf te herstellen.



Single Anastomosis Duodenal-Ileal bypass (SADI)

De arts combineert een sleeve gastrectomie met een darmomleiding. Hij verwijdert het maagdeel met de hongersensoren en leidt je 12-vingerige darm en een deel van je dunne darm om.



Sinusoperatie

functionele endoscopische sinuschirurgie (FESS)

Bij een sinusoperatie maakt de NKO-arts via je neus de doorgangen van je sinussen (neusbijholten) weer open.



Sleeve gastrectomie

maagverkleining via sleeveresectie, vermageringsoperatie

De chirurg snijdt een deel van je maag weg. Daardoor verkleint je maag en kan er minder voedsel passeren. Ook het hongergevoel vermindert.



Sluiting linkerhartoor

De arts sluit het linkerhartoor met een plugje om een beroerte te voorkomen bij patiënten met een onregelmatige hartritmestoornis en die geen medicatie mogen nemen.



Spalk- of bracetherapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan



Spinale verdooving

Spinale ruggenprik, spinale anesthesie, lumbale anesthesie

Met een spinale ruggenprik verdooft de anesthesist de onderste helft van je lichaam.

spalken en braces voor je hand, pols en

en nog.



Spinale-epidurale verdooving

combinatie spinale en epidurale verdooving, gecombineerde spinale-epidurale verdooving, spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde ruggenprik

De spinale ruggenprik verdooft de onderste helft van je lichaam. Daarna wordt er een katheter (zeer dun buisje) geplaatst voor de toediening van pijnmedicijnen.



Sport bij diabetes

Met ons bewegingsprogramma helpen we je als diabetespatiënt een actieve levensstijl aan te nemen én vol te houden. Met beweging houd je je bloedsuikerspiegel beter onder controle.



Sport na obesitaschirurgie

Dit is een bewegingsprogramma dat je kan volgen na een obesitasingreep. We proberen je gewichtsverlies te versnellen en leren je om te sporten op een manier die je kan volhouden.



Starten met medicatie bij IBD

IBD-aandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan je behandelen met medicatie zodat je minder last hebt van je klachten. Je arts adviseert je hierbij.



Stembandoperatie

microlaryngoscopie

Bij een stembandoperatie neemt de NKO-arts afwijkingen op je stembanden weg, bijvoorbeeld een poliep (goedaardige zwelling) of een cyste (blaasje gevuld met vocht).



Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.



Stent-implantatie

De arts plaatst stents om de vernauwing(en) van de kransslagaders open te maken. Een stent is een klein metalen veertje dat de kransslagader openhoudt.



Sterilisatie bij mannen

vasectomie

Met een kleine ingreep onderbreekt de uroloog de zaadleiters ter hoogte van de balzak.



Stijgbeugeloperatie

stapedotomie, stapeschirurgie

We nemen het bovenste gedeelte van de aangetaste stijgbeugel (1 van de 3 gehoorbeentjes in je oor) weg en plaatsen een prothese die de geluidsgolven doorgeeft aan het binnenoor.



Subtalaire arthrodese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



Tandimplantaten

Een implantaat is een titanium kunstwortel die je natuurlijke wortel vervangt. De tandarts vervaardigt hierop de bijhorende tand/kroon.



Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.



Stoppen met roken

ZAS organiseert regelmatig rookstopcursussen in groep.



Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



Tenodermodese

Tenodermodese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.



Therapeutische hysteroscopie

Kijkoperatie baarmoeder

Bij een therapeutische hysteroscopie kijkt de arts in de baarmoeder met een camera en voert ook meteen een ingreep uit. De camera zit op een buis die we inbrengen via de vagina.



Therapeutische laparoscopie

Kijkoperatie buikholte

Bij een therapeutische laparoscopie brengt de arts een camera en instrumenten in via sneetjes in de buik. Dat is minder ingrijpend dan een openbuikoperatie.



Tijdelijke overname

Tijdelijke overname van de ademhaling, nierfunctie en/of andere levensnoodzakelijke functies tot de patiënt opnieuw volledig zelfstandig kan functioneren.



Totale heupprothese

kuntheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een nieuwe versie, gemaakt uit metaal en kunststof.



Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij een totale knieprothese vervangen we de beschadigde delen van je eigen kniegewricht door nieuwe onderdelen, gemaakt van metaal en kunststof.



Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de traanzak en de neusholte. Zo kunnen de tranen weer via de neus worden afgevoerd.



Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

De cardioloog implanteert een nieuwe biologische hartklep als de aortaklep ernstig vernauwd is.



Transcutane elektrische neurostimulatie

TENS

Via elektroden op je huid stuurt het TENS-toestel elektrische prikkels naar je zenuwen. Het is een niet-ingrijpende methode om (chronische) pijn te verlichten zonder

medicatie.



Trapezectomie met het ligamentreconstructie

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.



Trommelvliesbuisjes

plaatsing diabolos

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



TUR blaas

transurethrale resectie blaas (TURB), wegname blaastumor via plasbuis

Een TUR blaas dient om via je plasbuis blaastumoren weg te halen.



Vaccinatie tegen de griep



Transforaminale epidurale infiltratie

De pijnarts plaatst na lokale verdoving in je lage rug een fijne naald tot in de epidurale ruimte in je wervelkolom en spuit daar pijnstillende medicatie in.



Triple arthrodesse

Een triple arthrodesse is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.



UV-therapie bij huidziekten

Ultravioletbestraling of UV-therapie werkt met een lichtcabine waarin je plaatsneemt.

griepvaccin, influenzavaccin, griepsput

Kwetsbare mensen en hun naasten kunnen zich tegen de griep beschermen door zich jaarlijks te laten vaccineren tussen oktober en december.



Vaccinatie tegen windpokken

vaccinatie tegen Varicella

Het vaccin tegen de windpokken behoort momenteel niet tot het standaard vaccinatieschema. Bespreek met je kinderarts of dit aanvullend vaccin nuttig is voor jouw kind.



Vakantiedialyse

Te veel tekens Voorstel: Op vakantie in België? Zet je dialyse voort bij ZAS.

Ben je al nierpatiënt binnen ZAS, dan helpen we je graag met je vakantiedialyse.



Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



Verwijderen van een polscyste



Vaccinatie tegen meningokokken type B

Vaccin tegen meningokokken type B

Aanvullend op het vaccin tegen meningokokken, dat al in het standaard vaccinatieschema zit, bestaat er ook een aanvullend vaccin tegen meningokokken type B.



Vaccinaties bij reuma

Patiënten met reumatische aandoeningen hebben een hoger risico op bepaalde infecties. Die infecties kunnen ook gecompliceerder verlopen door hun ziekte en hun medicatie.



Verslavingszorg voor volwassenen

We vinden het essentieel om een veilige omgeving te creëren waarin je kan ontwennen maar waar je ook zelf je verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opneemt.



Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



Vingeramputatie

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



Voedingsondersteuning bij ouderen

nutritionele ondersteuning bij ouderen

Bij elke geriatrische patiënt die opgenomen wordt in ons ziekenhuis, doen we standaard een voedingsscreening zodat we indien nodig onmiddellijk ondersteuning kunnen opstarten.



Volledige verdoving

Algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose

Bij een algemene verdoving wordt je hele lichaam verdoofd. Via een infuus krijg je slaapmiddelen toegediend waardoor je in een kunstmatige slaap valt.



Volledige verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen

Bij een algemene verdoving wordt het hele lichaam verdoofd. Bij kinderen gebeurt dat meestal met een maskertje waarlangs ze een slaapverwekkend gas inademen.



Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



Vroegtijdige zorgplanning voor ouderen

Met een geriater, ergotherapeut, psycholoog en sociaal werker kan je over de toekomst van je leven, de zorg die nog je wil en je levenseinde spreken.



Wegname baarmoeder (chirurgische genderzorg)

verwijdering baarmoeder, hysterectomie

In het zorgproces kan je kiezen voor een hysterectomie. De arts neemt dan je baarmoeder en eventueel ook je eierstokken en eileiders weg.



Wegname halscyste



Wegname halsfistel

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.



Wegname onderkaakspeekselklier

wegname glandula submandibularis, submandibulaire speekselklierwegname

Wegname van de volledige onderkaakspeekselklier kan nodig zijn bij chronische ontsteking (met steenvorming) of als er goedaardige of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn.



Wegname oorspeekselklier

wegname glandula parotis, parotidectomie

Oppervlakkige of totale wegname van de oorspeekselklier kan nodig zijn bij gezwellen van de oorspeekselklier zoals het pleiomorf adenoom en het adenolymfoom (Warthin-gezwel).



Wegname strottenhoofd

laryngectomie

Bij een laryngectomie nemen we je strottenhoofd (larynx) weg. De reden daarvoor is in de meeste gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).



Wegname teelballen (chirurgische genderzorg)

verwijdering teelballen, orchidectomie

In het zorgproces kan je kiezen voor een orchidectomie. De uroloog neemt dan beide teelballen weg.



Weke delen operatie

Dat zijn weefsels onder je huid die zich o.a. rond je organen, spieren en botten bevinden. De chirurg opereert bij o.a. huidletsels, lipomen, cysten, melanomen en sarcomen.



Wondzorg bij ouderen

Het wondzorgprogramma richt zich tot geriatrische patiënten met moeilijk helende, lang aanslepende of complexe wonden.



Zenuwverdooving

zenuwblokkade, zenuwblok, zenuwblock, perifere zenuwblokkade, perifeer zenuwblok, locoregionale verdoving, locoregionale anesthesie, plexusverdoving, plexusanesthesie, plexusblok, plexusblokkade

Bij een zenuwblok verdooft (blokkeert) de anesthesist een zenuw of een zenuwbundel (plexus). Zo wordt alleen dat deel van je lichaam verdoofd waar de ingreep plaatsvindt.



Zuurstoftherapie bij longaandoeningen

Via je neus of mond krijg je extra zuurstof. Daardoor moeten je longen en je hart minder hard werken.



Zaadcellen invriezen bij gendertransitie

spermaopslag, zaadcelpreservatie, cryopreservatie, fertiliteitspreservatie, vruchtbaarheidspreservatie, vruchtbaarheidsbescherming

Voor de start van de hormoontherapie of ingreep kan je ervoor kiezen om zaadcellen te laten invriezen. Zo behoud je de optie om



een biologische kinderen te krijgen.

Zenuwwortelblokkade

Bij een zenuwwortelblokkade verdooft de pijnarts een zenuwwortel om je pijn te verminderen. Dat kan ter hoogte van je nek, borst of onderrug.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-cadix>