



Openen smalle bloedvaten

Om een versmalling in de bloedvaten weer open te krijgen werkt de chirurg met een ballonnetje of een stent.

De vaatchirurg geeft altijd de voorkeur aan de minst ingrijpende behandeling. Bij een vernauwde slagader of ader is dat meestal een ballonnetje. Heeft dat te weinig effect? Dan is de volgende stap een stent: een metalen buisje dat wordt ingebracht in de slagader of ader.

Laatst bijgewerkt op 11/02/2026

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Vaatheekunde

vasculaire chirurgie
bloedvatenchirurgie
vaatchirurgie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Polikliniek Hof ter Schelde

ZAS Polikliniek Regatta

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/openen-smalle-bloedvaten>