



Behandelopties bij ontbrekende tanden

Het kan gebeuren dat je één of meerdere tanden verliest. Een kroon, brug, implantaat of prothese kan ontbrekende tand(en) vervangen.

Op deze pagina

1. Wat zijn ontbrekende tanden?
2. Behandelopties bij verlies van één tand
3. Behandelopties bij verlies van meerdere tanden
4. Behandelopties bij verlies van alle tanden in de onderkaak
5. Behandelopties bij verlies van alle tanden in de bovenkaak

Wat zijn ontbrekende tanden?

Door onvoldoende mondhygiëne, een val, te veel zoet of zuur eten en drinken, roken, gebitsslijtage... kan het gebeuren dat je één of meerdere tanden kwijtraakt.

Ontbrekende tanden zijn minder mooi als je lacht en kunnen er ook voor zorgen dat je moeilijker kan kauwen. Daarnaast krijgen je buurtanden minder steun.

Er bestaan verschillende opties om ontbrekende tanden te vervangen. Welke behandeloptie voor jouw situatie het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren. De tandarts of [MKA-arts](#) legt je alle mogelijkheden uit en kan inschatten welke behandeloptie voor jou de beste is.

Behandelopties bij verlies van één tand

Wie één tand verliest, heeft een zwart gat tijdens het lachen. Dat is minder mooi. Maar het kan ook voor andere problemen zorgen. Er blijft bijvoorbeeld gemakkelijk voeding achter in de opening en je kan moeilijker kauwen. Bovendien verliezen de buurtanden hun steun. Er bestaan twee opties om de opening op te vullen: via een brug of met een solitair [implantaat](#) met kroon.

Een vaste brug op de natuurlijke tanden

Bij een vaste brug worden de buurtanden – de tanden links en rechts van het gat – geslepen in de juiste vorm. Daarna neemt de tandarts een afdruk van het gebit. Het laboratorium maakt op basis van deze afdruk een brug die over de afgeslepen tanden past en de tussenliggende leegte opvult. Die brug lijmt de tandarts vervolgens vast.

Een solitair implantaat met kroon

Deze behandeling gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

Bij een solitair implantaat plaatst de MKA-arts één implantaat, op de plaats waar vroeger de wortel van de ontbrekende tand zat. Is er niet voldoende bot om het implantaat te plaatsen? Dan is er eerst een voorbehandeling bij de MKA-arts nodig.

Zodra het solitaire implantaat is ingegroeid in het bot, kan de tandarts er een kroon op plaatsen. Het implantaat is de 'kunstwortel', de kroon is de 'kunsttand'.

Behandelopties bij verlies van meerdere tanden

Soms is de ruimte van de ontbrekende tanden te groot voor een vaste brug of solitair implantaat. Een gedeeltelijke uitneembare prothese of meerdere implantaten met een brug kunnen de leegte dan opvullen.

Een gedeeltelijke uitneembare prothese of een vals gebit

Een gedeeltelijke uitneembare prothese of vals gebit zit minder vast dan echte tanden, implantaten of kroon- en brugwerk. Je kan de prothese namelijk eenvoudig uit je mond nemen, waardoor je het gemakkelijk kan onderhouden. Deze optie kan je tandarts zelf maken.

Meerdere implantaten met een vaste brug

Deze behandeling gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

Je MKA-arts plaatst eerst 2 of meerdere implantaten. Is er niet voldoende bot om het implantaat te plaatsen? Dan is er eerst een voorbehandeling bij de MKA-arts nodig.

Zodra de implantaten zijn ingegroeid in het bot, maakt de tandarts een brug die steunt op de implantaten.

In tegenstelling tot de gedeeltelijke uitneembare prothese zijn implantaten met een brug een stuk steviger. Ze voelen ook als echte tanden. Maar dat betekent ook dat ze moeilijker te onderhouden zijn in vergelijking met een vals gebit.

Behandeloptyes bij verlies van alle tanden in de onderkaak

Sommige mensen verliezen alle tanden in hun onderkaak. In dat geval bestaan er 3 behandelopties: een prothese die je volledig kan uitnemen, een klikgebit dat steunt op 2 implantaten of een brug die steunt op 4 implantaten.

Een volledige uitneembare prothese

Heb je alle tanden in je onderkaak verloren, maar is je kaakbot nog voldoende hoog en breed? Dan is een volledige uitneembare prothese een goede oplossing. Je kan de prothese eenvoudig uit je mond nemen, waardoor je het gemakkelijk kan onderhouden. Maar daardoor zit het wel relatief los in de mond. Je tandarts kan deze oplossing zelf maken en er zijn geen verdere ingrepen nodig.

Als het kaakbot lange tijd tandloos is, kan het wegsmelten. Daardoor komt de prothese na verloop van tijd losser te zitten. Dat kan kauwproblemen veroorzaken. Soms valt de prothese zelfs spontaan uit tijdens het eten of praten. Implantaten zijn dan vaak een oplossing.

2 implantaten met een klikgebit

Deze behandeling gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

De MKA-arts plaatst de 2 implantaten op de plek waar vroeger de hoektanden stonden.

Zodra de implantaten zijn ingegroeid in het bot, maakt de tandarts een klikprothese, die op de drukknopjes of baar 'klikt'. De implantaten zorgen ervoor

dat het klikgebit stabiel blijft, maar het gebit blijft wel uitneembaar. Dat maakt het reinigen eenvoudig.

Het RIZIV voorziet eenmalig een gedeeltelijke terugbetaling voor de plaatsing van 2 implantaten met een klikgebit voor patiënten die

- ouder zijn dan 70 jaar en
- minstens 12 maanden een volledige uitneembare prothese hebben gedragen op een onderkaak zonder tanden. Die prothese moet op een correcte manier gemaakt zijn en minstens 12 maanden oud zijn.

4 implantaten met een vaste brug

Deze behandeloptie gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

Heb je liever een oplossing waarbij de tanden op je onderkaak volledig vast zitten? Dan zijn 4 implantaten met een vaste brug soms een optie. De MKA-arts plaats de 4 implantaten in je onderkaak.

Zodra de implantaten zijn ingegroeid in het bot, maakt de tandarts een groot brugwerk, dat vastgemaakt wordt op de implantaten. Omdat de vaste brug niet uitneembaar is, is deze oplossing moeilijker om te onderhouden.

Behandelopties bij verlies van alle tanden in de bovenkaak

Sommige mensen verliezen alle tanden in hun bovenkaak. In dat geval bestaan er 3 behandelopties: een prothese die je volledig kan uitnemen, een klikgebit dat steunt op 4 implantaten of een brug die steunt op 6 implantaten.

Een volledige uitneembare prothese

Heb je alle tanden in je bovenkaak verloren, maar is je kaakbot nog voldoende hoog en breed? Dan is een volledige uitneembare prothese een goede oplossing. Je kan de prothese eenvoudig uit je mond nemen, waardoor je het gemakkelijk kan onderhouden. Maar daardoor zit het wel relatief los in de mond. Je tandarts kan deze oplossing zelf maken en er zijn geen verdere ingrepen nodig.

Een bovenprothese zit iets stabielere dan een onderprothese, omdat de prothese zich vastzuigt aan het verhemelte. Het nadeel? Doordat het verhemelte bedekt

is, kan je smaak anders ervaren. Mensen met een gevoelig verhemelte hebben daarnaast soms braakneigingen.

4 implantaten met een klikgebit

Deze behandeling gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

De MKA-arts plaatst 4 implantaten in de bovenkaak. Zodra de implantaten zijn ingegroeid in het bot, worden drukknopjes of een baar geïnstalleerd op de implantaten. Daarna maakt de tandarts een klikprothese die op de drukknopjes of baar 'klikt'. De implantaten zorgen ervoor dat het klikgebit stabiel blijft, maar het gebit blijft wel uitneembaar. Dat maakt het reinigen eenvoudig.

Op deze manier is een bedekking van het verhemelte niet altijd nodig. Bovendien lijkt de roze kunststof van het klikgebit op natuurlijk tandvlees, waardoor het resultaat mooier is en ongelijkheden weggewerkt worden.

6 implantaten met een vaste brug

Deze behandeloptie gebeurt voor een deel bij de MKA-arts en voor een deel bij de tandarts.

Heb je liever een oplossing waarbij de tanden op je bovenkaak volledig vast zitten? Dan zijn 6 implantaten met een vaste brug een goede optie. De MKA-arts plaats de 6 implantaten in je bovenkaak.

Zodra de implantaten zijn ingegroeid in het bot, maakt de tandarts een groot brugwerk, dat vastgemaakt wordt op de implantaten. Omdat de vaste brug niet uitneembaar is, is deze oplossing moeilijker om te onderhouden. Je onderhoudt de brug zoals je je gewone tanden zou poetsen: goed reinigen en flossen rondom de implantaten.

Op deze manier is een bedekking van het verhemelte niet nodig.

Voor meer informatie over de behandelopties, de kostprijs en het verloop van de behandelingen kun je terecht bij je MKA-arts tijdens de raadpleging.

Laatst bijgewerkt op 04/09/2025

Diensten



Dienst

MKA (mond-, kaak- en aangezichtschirurgie)

MKA

mondchirurgie

kaakchirurgie

aangezichtschirurgie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandelopties-bij-ontbrekende-tanden>