



ZAS Hoge Beuken

Algemene afsprakenplanning en info

☎ [03 830 90 90](tel:038309090)

✉ hb.info@zas.be

Bezoekuren

Algemene verpleegafdelingen: van 10 tot 20 uur

Verpleegafdeling S33 (neurologie): van 14 tot 20 uur

OVER

ZAS Hoge Beuken

ZAS Hoge Beuken is een gespecialiseerd ziekenhuis voor geriatrie en revalidatie. Je kan er terecht om de beweeglijkheid van je lichaam te revalideren (onder andere na orthopedische ingrepen) of om te herstellen van hersen-, rug- en zenuwletsels.

Het ziekenhuis biedt daarnaast een hele waaier aan technische- en bloedonderzoeken. Je kan er onze specialisten in tal van medische domeinen raadplegen in de polikliniek of een behandeling krijgen in het dagziekenhuis.

 Dit is een rookvrije campus

Deze campus is **volledig** rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangeduide rookzones.

Bereikbaarheid

Met de auto

Het adres van ZAS Hoge Beuken is Commandant Weynsstraat 165, 2660 Hoboken.

[Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.](#)

Parking

ZAS Hoge Beuken heeft een **betalende parking**. Je betaalt 1,25 € per uur. Je vindt die aan de hoofdingang, ter hoogte van **inrit 6 en aan inrit 4 voor de afdelingen neurologie en neurorevalidatie**.


Met de fiets

Je kan ook gebruik maken van de stadsfietsen van Velo Antwerpen. Meer info over de stadsfietsen en over de Velo-stations vind je op de [website van Velo Antwerpen](#). Velo-station 285 bevindt zich aan de hoofdingang, ter hoogte van afrit 6.

Met het openbaar vervoer

- [Gebruik Google Maps.](#)

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- [Gebruik de routeplanner van De Lijn](#)
- [Plan je treinreis op de website van NMBS](#)

Bereken je route

Wandelafstand ▼ 5 min ▼

[📍 Geef me reisadvies](#)

Filters en lagen

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner omvat. Deze widget maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van onze website om deze verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar Antwerpen opslaat zijn:

Voorzieningen

Horeca

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Bezoekerscafeteria	Warme en koude dranken, belegde broodjes, snacks en gebak	In de hal van het ziekenhuis	Werkdagen 12.30 uur - 17 uur (keuken sluit om 16.30 uur) Weekend 13.30 uur - 17 uur

(keuken sluit om
16.30 uur)

Feestdagen
gesloten

Is de cafetaria gesloten? In onze campus vind je op verschillende plaatsen automaten met dranken en snacks. Daar kan je dag en nacht terecht voor een verfrissing of snelle hap.

Wifi/telefoon

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

Voor patiënten

Tuin

Wie even tot rust wil komen in de natuur, kan een wandeling maken in de tuin rond Hoge Beuken. De tuin is vrij toegankelijk, maar laat het even weten aan de verpleging als je de afdeling verlaat.

Kapper en pedicure

Nood aan een moment zelfzorg? In ZAS Hoge Beuken kan je tijdens je verblijf je haar laten knippen of een ontspannende voetverzorging krijgen.

ZAS Hoge Beuken heeft een eigen kapsalon, voor zowel mannen als vrouwen, op de gelijkvloerse verdieping (blok 1). De kapper knipt op woensdag en donderdag.

Je kan een afspraak maken bij de kapper door te bellen naar 03 830 90 90 kies 2, of via de verpleging op jouw afdeling. Dan maken zij een afspraak voor jou. Ook een pedicure bestellen kan via de verpleging. Je betaalt via de ziekenhuisfactuur.

Kluisjes

In ZAS Hoge Beuken hebben alle kamers een kluisje. Daarin kan je jouw persoonlijke spullen veilig achterlaten.

Diensten

☰ Filter deze pagina

1 - 9 van 32



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Dienst

Anesthesie

Verdoving, pijnstilling



Dienst


Diëtisten

voedingsadvies,
voedingsconsultatie



Expertisecentrum

Expertisecentrum voor complexe pancreaschirurgie



Dienst



Dienst

Fysische geneeskunde en revalidatie

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten



Dienst

Gastro-enterologie voor kinderen

maag-darmaandoeningen bij kinderen, leverproblemen bij kinderen, voedingsproblemen bij kinderen



Expertisecentrum

Geheugenkliniek



Dienst

Geriatric

Ouderdomsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde

1

2

3

4



Laatste »

Onderzoeken

Filter deze pagina



24 uurs-EEG

24 uurs-elektro-encefalogram

Deze test meet 24 uur lang de hersenactiviteit om problemen op te sporen die we in korte tests niet altijd vinden. We kijken hoe de hersenen werken, ook tijdens de slaap.



24-uursbloeddrukmeting

Een draagbaar apparaat meet op vaste tijdstippen en tijdens dagelijkse activiteiten je bloeddruk. Deze reeks metingen geeft een objectief beeld van je bloeddruk.



6 minutenwandelttest

zesminutenwandelttest, 6MWT

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen 6 minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je hartslag.



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.



Artrografie

Artrografie is een onderzoek waarbij we contrastvloeistof in een gewricht injecteren en er daarna röntgenbeelden van maken.



BAEP-onderzoek

brainstem auditory evoked potential (BAEP)

BAEP kijkt hoe je hersenen reageren op geluiden. De test helpt om gehoor- en zenuwproblemen in de hersenstam te ontdekken.



BERA-onderzoek

brainstem evoked response audiometrie, auditory brainstem response (ABR)



Bloedgasbepaling

We nemen een bloedstaal uit de slagader in je pols om het zuurstof- en koolzuurgehalte in

Met deze objectieve gehoortest meten we het gehoor tot op het niveau van de hersenstam (hersenstamaudiometrie).



Bloedonderzoek bij IBD

In je bloed kunnen we zien of je een ontsteking, bloedarmoede of een vitaminetekort hebt.

je bloed te meten. Zo komen we te weten hoe goed je longen functioneren.



Bloedonderzoek om mucoviscidose op te volgen

Met een bloedonderzoek kunnen we bij mucopatiënten de werking van de nieren, lever en alvleesklier nagaan en de hoeveelheid vitamines meten.



Borstbiopsie

tru-cut biopsie, invasief weefselonderzoek

Bij een borstbiopsie verwijdert de arts wat weefsel van de borstklier. Dat weefsel wordt daarna onder de microscoop onderzocht om te zien of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.



Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



Capsuleonderzoek van de dunne darm

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen. In de praktijk is dit onderzoek zelden nodig.



Cardiale MRI

Met deze techniek maakt de cardioloog gedetailleerde beelden van je hart. Hij krijgt een beeld van o.a. de grootte van de hartkamers en de dikte van de hartspierwand.



Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een



Coronarografie

röntgenonderzoek kransslagaders

De arts brengt via je pols of lies een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter

endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.

spruit hij contraststof en röntgenstralen in die de kransslagaders in beeld brengen.



Dermoscopie

Bij dermoscopie bekijken we een moedervlek via een loep of scan. Zo weten we of deze goed- of kwaadaardig is.



Diagnostische hysteroscopie

Kijkonderzoek baarmoeder

Bij een diagnostische hysteroscopie kijken we in de baarmoeder met een kleine camera die we inbrengen via de vagina. Zo kan de arts afwijkingen in de baarmoeder opsporen.



Diagnostische laparoscopie

kijkonderzoek buikholte

Een diagnostische laparoscopie is een kijkonderzoek van de buikholte. De arts brengt een kleine camera in om je buikholte of organen te bekijken.



Doppleronderzoek

dopplertechniek, kleurendoppler, kleurendoppler-echografie

Met de dopplertechniek worden naast de grijswaarden van het echografisch onderzoek ook kleuren afgebeeld en hoorbare geluiden geproduceerd.



Duplex arteria temporalis

Bij dit onderzoek maken we gebruik van 2 technieken die werken met geluidsgolven: echografie en doppler. We kijken naar de slagader aan de zijkant van het hoofd bij de slaap.



Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



Echo-endoscopie

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je



Echocardiografie

Een echo geeft de cardioloog via geluidsgolven meer informatie over de afmeting van de hartkamers, de wand- en klepbewegingen en eventuele afwijkingen.

spijsverteringskanaal. Soms nemen we
wafsel af voor onderzoek.



Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie borstkas

echografie thorax

Met dit onderzoek kan je longarts met onhoorbare (ultrasone) geluidsgolven afwijkingen opsporen in je borstkas zoals vochtophopingen.



EEG

elektro-encefalogram

EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.



Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek,
elektromyografisch onderzoek,
zenuwgeleidingsonderzoek

Met een elektromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het hoort.



Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje

De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.



Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Met hoogtechnologische meettechnieken en meetelektroden onderzoekt de arts de elektrische werking van je hart en spoort hartritmestoornissen op.



Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS) transbronchial needle aspiration (TBNA)



Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.

Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.



Ergospirometrietest

Deze uitgebreide inspanningstest geeft een zeer compleet beeld van de conditie van mensen met hartproblemen en vergelijkt die met de resultaten van gezonde mensen.



Event recording

Je krijgt een event recorder mee naar huis om een opname van je hart te maken op het moment dat je een hartritmestoornis voelt. De cardioloog beoordeelt nadien alle opnames.



Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de evenwichtsorgaanjes in je binnenoor en geven we de werking van je evenwichtssysteem weer in grafieken.



Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.



Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de



Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP) , Goldmann gezichtsveldonderzoek

luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftrillingen (toonhoogte).



Holtermonitoring

Met een draagbaar apparaat op de borstkas meet de cardioloog voortdurend de elektrische activiteit van je hart om de oorzaak van de hartritmestoornis op te sporen.

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



Hyperventilatietest

De longarts vraagt je om in een sneller tempo te ademen om het koolzuur in de uitgeademde lucht te kunnen meten. De test dient om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen.



Inspanningstest

Tijdens deze test lever je op een speciale hometrainer een inspanning. Voor, tijdens en na de test gebeuren er metingen die de arts vertellen hoeveel je hart belast wordt.



Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.



Isotopenonderzoek (MIBI-scan)

Dit onderzoek brengt de doorbloeding en de pompfunctie van je hart in beeld. Dat gebeurt aan de hand van een licht radioactieve stof die de arts via een infuus inspuit.



Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het

lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.

borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Kijkoperatie longvliezen

endoscopie longvliezen, pleuroscopie

Bij een pleuroscopie kijkt je arts met een kleine camera of pleuroscop naar je longvliezen (pleurabladen). Je bent hierbij verdoofd, maar je blijft zelf ademen.



Kleurstoffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.



Klinisch onderzoek orthopedie

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



Lactose-intolerantietest

lactose-blaastest, waterstof-ademtest

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.



Leverbiopsie

leverpunctiebiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.



Longfunctieonderzoek

longfunctietest

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Longpunctie

punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een



Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.

klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.



Mammografie

röntgenfoto borsten

Een mammografie brengt met röntgenstralen het borstweefsel in beeld. Het onderzoek dient om borstletsels op te sporen en op te volgen. Het duurt ongeveer een kwartier.



MEP

motor evoked potential

MEP kijkt hoe je spieren reageren wanneer de hersenen magnetisch worden gestimuleerd. Zo kunnen we zien hoe goed je zenuwen en spieren werken.



Microscopisch onderzoek bij schimmelinfecties en vermoeden van schurft

Als we vermoeden hebben van schimmelinfectie of schurft, nemen we een staaltje van de huid. Dit onderzoeken we microscopisch.



Microscopisch oonderzoek

micro-otoscopie

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



MRI van de dunne darm

enterografie

Bij een enterografie maken we met een MRI-toestel via radiogolven foto's van je dunne darm. Hiervoor ga je op een tafel liggen die een tunnel wordt geschoven.



Muscoskeletale echografie

MSK-echografie

Bij dit onderzoek stuurt een toestelletje geluidgolven door je lichaam. Die weerkaatsen op je spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten, waardoor we ze zien op een scherm.



Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en



Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die

eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



Neusdoorgankelijkheidstest

rhinomanometrie

Bij een rhinomanometrie meten we hoeveel lucht er door je neus gaat als je in- en uitademt. Zo achterhalen we de weerstand en in welke mate er sprake is van een verstopping.

beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



Neuspotentiaal meting

NPD-meting

Zout bestaat uit de stoffen natrium en chloor. De arts kan die meten in de neus om te onderzoeken hoe in het lichaam zout van de ene cel naar de andere gaat.



NMR

Nucleaire Magnetische Resonantie

Een NMR-scan maakt gedetailleerde beelden van binnen in het lichaam. NMR werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven



NO-meting

FeNO-onderzoek

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de lucht die je uitademt. Zo kunnen we luchtwegontstekingen en gevoeligheden van je luchtwegen opsporen.



Onderzoek van je stoelgang

Zijn je darmen ontstoken? Dan vinden we een bepaald eiwit in je stoelgang: calprotectine. Je stoelgang kan ook aantonen of je last hebt van een virus, bacterie of parasiet



Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatie-



Oogonderzoek bij kinderen

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en onderzoeken het hoornvlies, de lens, de oogzenuw en het netvlies.

tonometer of met een 'luchtpuf'



spirometrie of pneumotonometrie)

Pijndiagnose

pijndiagnostiek

Als je pijn signaleert, gaat je arts op zoek naar de oorzaak om die indien mogelijk weg te nemen en je pijn te verlichten.



Pijnmeting

NRS-score

Bij een pijnmeting vraagt de zorgverlener om je pijn uit te drukken in een cijfer tussen 0 (geen pijn) en 10 (de ergst denkbare pijn).



Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.



Preoperatieve voorbereiding

preoperatief nazicht, preoperatieve screening (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



Provocatietest voor bronchiale hyperreactiviteit

histamineprovocatietest, metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de gevoeligheid van je luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine of metacholine in, een prikkelende maar onschadelijke stof.



Rechterhartkatherisatie

De arts brengt een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter meet hij de druk, het hartdebiet en het zuurstofgehalte.



Röntgenonderzoek

radiografie, RX, RX-onderzoek, conventionele radiologie, röntgenfoto

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en structuren van je lichaam zichtbaar. Soms krijg je eerst een contrastmiddel toegediend.



Rugpijn onderzoeken

Een onderzoek om je rugpijn in kaart te brengen en eventueel een behandelplan op te stellen.



Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.



Slokdarmmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.



Sputumtest

Voor de behandeling van luchtweginfecties moeten we weten welke bacteriën in je luchtwegen zitten. Daarom laten we regelmatig fluimen (sputum) onderzoeken in het laboratorium.



SSEP

somato sensory evoked potential

SSEP test hoe je hersenen reageren op aanraking. We kijken dan hoe snel die gevoelsprikkels je hersenen bereiken.



Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd,
kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



Telemonitoring bij hartproblemen

Via telemonitoring zenden geïmplanteerde toestellen, zoals pacemakers, ICD's en CRT's, elke nacht belangrijke informatie door naar de arts, die deze metingen dagelijks bekijkt.



Tilttest

Tijdens dit onderzoek lokt de cardioloog, onder gecontroleerde omstandigheden, flauwvallen uit. Zo kan hij de oorzaak van frequent flauwvallen of duizeligheid opsporen.



Transcraniële duplex

Transcraniële duplex is een neurologische test met geluidsgolven om te kijken hoe het bloed in je hersenen stroomt en om problemen in je bloedvaten te vinden.



Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening,
baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan op termijn tot baarmoederhalskanker leiden.



Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige gynaecologische echografie

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.



VEP

visual evoked potentials

VEP bekijkt hoe je hersenen reageren op flitsen of patronen. Zo controleren we of er problemen zijn bij het zien.



Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

Behandelingen

 Filter deze pagina

1 - 242 van 242



Ablatie bij hartritmestoornissen

ablatie bij voorkamerfibrillatie (VKF), katheterablatie bij VKF

Door gebruik te maken van warmte- of koude-energie verhelpt de arts de elektrische storing in je hart.



Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesitherapie of een operatie.



Alvleesklierchirurgie of pancreaschirurgie

pancreasoperatie, operatie aan de alvleesklier

Bij bepaalde aandoeningen aan de pancreas maakt een operatie deel uit van de behandeling, meestal om de aangetaste delen van de pancreas weg te halen.



Amandeloperatie

tonsillectomie

Bij een amandeloperatie neemt de NKO-arts van je mond je amandelen (tonsillen) weg.



Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



AR-chirurgie voor het plaatsen van een prothese

augmented reality, AR-operatie, NextAR, AR-ingreep

Bij AR-chirurgie ziet de chirurg tijdens de ingreep zowel de operatietafel als informatie uit een CT-scan door een AR-bril. De arts hoeft niet weg te kijken tijdens de operatie.



Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.



Arthroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te

bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Artroscopie knie

kijkoperatie knie, arthroscopie knie

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het kniegewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



Artroscopie schouder

kijkoperatie schouder, arthroscopie schouder

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de schouder vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Artroscopie van de heup

kijkoperatie heup, arthroscopie heup, heupartroscopie

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het heupgewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.



Begeleidingstraject in Multidisciplinair pijncentrum

behandeltraject MPC

We bieden patiënten met complexe chronische pijn een begeleidingstraject op maat met groepssessies en individuele begeleiding. Dat vraagt een bepaalde inzet en actieve medewerking.



Behandeling afasie

De logopedist leert je de handelingen voor het dagelijks leven opnieuw aan en blijft die trainen. Hij/zij zet ook in op ondersteunde communicatie om je communicatie te verbeteren.



Behandeling astma



Behandeling bronchiëctasieën

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het voorkomen van infecties.

Dikwijls is een behandeling met een puffer

De arts en/of verpleegkundige geeft

Behandeling dysartrie

De logopedist richt zich op je ademhaling, resonantie, prosodie, stemgeving en/of articulatie. Hij/zij leert je strategieën aan om de verstaanbaarheid van je spraak te verhogen.

Behandeling dysfagie

De logopedist maakt gebruik van revaliderende of compenserende technieken, of een combinatie van beide.

Behandeling dysfonie

De logopedist start met een stemtherapie om je houding en ademhaling te verbeteren. Je doet stemontspannende en stemversterkende oefeningen.

Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.

Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.

Behandeling hypersensitiviteitspneumonitis

Soms kan stoppen van de oorzakelijke medicatie of ingeademde stof voldoende zijn maar vaak zijn immuunonderdrukkende medicijnen nodig.

Behandeling interstitieel longlijden

Medicijnen kunnen de ontstekingen in je longen onderdrukken. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt af van de oorzaak. Je longarts zal je meer uitleg geven.

Behandeling klaplong

behandeling pneumothorax

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de soort en ernst van de klaplong. Soms is het nodig om een drain te plaatsen of een kijkoperatie uit te voeren.



Behandeling longhypertensie

De behandeling van longhypertensie hangt af van de oorzaak, de ernst en de aanwezigheid van andere ziekten. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwell, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling longontsteking

behandeling pneumonie

Een longontsteking kan meestal goed behandeld worden met antibiotica. Soms is een specifieke gerichte behandeling nodig.



Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



Behandeling mucoviscidose

Bij mucoviscidose volgen we nauwgezet problemen met de longen en de spijsvertering op.



Behandeling na het verwijderen van een tumor uit het hoofd- en halsgebied

Als een tumor uit je mondholte verwijderd wordt, ervaar je de eerste weken of maanden na de operatie vaak problemen met eten en spreken. De logopedist richt een behandeling op.



Behandeling perifere aangezichtsverlamming

De logopedist werkt volgens de principes van de mimetherapie. Hij/zij geeft oefeningen om de spiergroepen en delen van je lichaam voor je expressie bewust te gebruiken.



Behandeling pleuravocht

Je longarts plaatst een naald of een slangetje (thoraxdrain) tussen je ribben om het opgehoopte vocht tussen je longvliezen weg te halen.



Behandeling primair progressieve afasie

PPA

Mensen met PPA en hun naasten kunnen baat hebben bij begeleiding door een logopedist. Een logopedisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de diagnosestelling.



Behandeling slaap- en waakstoornissen

Afhankelijk van het onderliggende probleem stelt een multidisciplinair team van artsen een specifieke behandeling voor jou voor.



Behandeling spraakmoeilijkheden na een totale laryngectomie

Bij een totale laryngectomie verwijdert de arts je stemplooiën, waardoor je na de operatie niet meer kan praten op de gewone manier. De logopedist leert je opnieuw praten.



Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



Behandeling sarcoïdose

Meestal gaat de ziekte vanzelf over. Soms is medicatie nodig om het immuunsysteem te onderdrukken.



Behandeling spraakapraxie

Deze therapie start meestal met het deblokken van je spraak. Als dat een succes is, drilt de logopedist op woorden, woordgroepen en eventueel zinnen.



Behandeling tuberculose

Als je tuberculose hebt, kan je in principe volledig genezen met antibiotica.



Bekkenbodemkinesithérapie

bekkenbodemtherapie, bekkenbodemkiné, bekkenbodemoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, pelvische reëducatie

Met bekkenbodemkinesithérapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodemspieren.



Bekkenbodempoperatie

Een operatie aan je bekkenbodemp om bijvoorbeeld incontinentie of een endeldarmverzakking te behandelen.



Bewegingsprogramma bij de ziekte van Bechterew

spondylitis ankylosans revalidatie

Bij de ziekte van Bechterew zijn je gewrichten in je rug zo lang ontstoken, dat ze stijver worden en niet meer goed kunnen bewegen. Gerichte oefeningen kunnen dan helpen.



Bewegingsprogramma bij kanker

oncologisch bewegingsprogramma, oncologische revalidatie, oncorevalidatie

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je lichaam. Met ons bewegingsprogramma helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen.



Bijnierchirurgie

Ook wel adrenalectomie genoemd. De arts verwijdert operatief één of beide bijnieren. Je bijnieren zorgen voor een goede bloeddruk en produceren verschillende hormonen.



Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.



Botoxbehandeling bij neurologische aandoeningen

inspuiting met botox

We spuiten een kleine hoeveelheid botulinumtoxine of botox in bepaalde spieren in. Dat zorgt ervoor dat de zenuwen geen signaal naar die spieren sturen. Ze worden verlamd.



Botuline-injecties

botulinebehandeling



Buikwandchirurgie

Een operatie aan je buik om bijvoorbeeld een buikwandbreuk, liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk te behandelen.

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



Cardiale revalidatie

hartrevalidatie

Een belangrijk onderdeel van het herstelproces na een hartziekte. Je krijgt na een behandeling of operatie een persoonlijk revalidatieschema.



Cardioversie

De arts geeft je hart een 'reset'. Door een elektrische schok toe te dienen, stopt het abnormale hartritme en gaat het over naar een normaal ritme.



Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglens en vervangen ze door een heldere implantlens in kunststof. Die gaat in principe levenslang mee.



Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige aanwasten rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.



Chirurgie bij huidziekten

Chirurgie is het wegsnijden van een stukje huid of gezwel. Dit doen we onder lokale verdoving. De huid wordt terug afgesloten met hechtingen.



Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het



Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.

biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in



Crisisinterventie

Als continue psychiatrische zorg gedurende 24 uur vereist is, kan een crisisopname worden overwogen als onderdeel van het zorgplan.



Cryotherapie

Met Cryotherapie behandelen we huidaandoeningen door middel van bevriezing.



Dag- en nachtopname

Tijdens een opname wordt een geïntegreerde, globale behandeling door een multidisciplinair team aangeboden.



Dagopname

UKJA beschikt over vijf leefgroepen voor dagopname. Daarbij bieden we een intensief en multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch traject aan.



Defibrillator

Een apparaat dat je hartritme voortdurend bewaakt en optreedt bij abnormale hartritmes. Het zorgt ervoor dat het hart na een hartritmestoornis weer normaal gaat werken.



Dementiezorg voor ouderen

Voor dementie bestaat er momenteel geen genezende behandeling. We kunnen wel proberen het verstandelijk verlies en het verlies aan zelfredzaamheid tijdelijk te vertragen.



Desensibilisatietherapie voor wespengif, huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat die stof geen allergische reactie meer uitlokt.



Diagnose en opvolging geheugenproblemen

Dit zorgpad laat toe om onzekerheden weg te nemen, een eenvoudige screening uit te voeren en tijdig in te grijpen op corrigeerbare geheugenklachten.



Dilatatie

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).



DRUJ prothese

Distal Radioulnar Joint prothese

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie geven we je een injectie terwijl we een echografie uitvoeren. Zo kunnen we de naald gericht sturen en zien we beter waar de medicatie terecht komt.



Elleboogprothese

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Endoscopische mucosale resectie (EMR)



Diple arthrodesese

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven



Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.



Elektrocoagulatie

Bij elektrocoagulatie branden we huidweefsel weg. Dit gebeurt onder verdoving.



Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.



Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het slechte weefsel weg te nemen.



Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine instrumenten in via een endoscoop.



Epidurale infiltratie

interventionele pijnbehandeling

De pijnarts plaatst na lokale verdoving een fijne naald tot in de ruimte rond je ruggenmerg en de zenuwwortels die daaruit ontstaan en spuit daar pijnstillende medicatie in.



Epidurale verdoving

epidurale ruggenprik, epidurale anesthesie, peridurale analgesie

Met een epidurale ruggenprik blokkeert de anesthesist tijdelijk de doorstroming van pijnprikkels naar de hersenen.



Epidurale verdoving bij bevalling

epidurale ruggenprik, peridurale analgesie bij bevalling, epidurale anesthesie

De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en de bevalling is de epidurale verdoving of ruggenprik.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.



Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



Facetbehandeling

De pijnarts stelt een facetbehandeling voor als die vermoedt dat je pijnklachten hun



Galblaas- en galwegenchirurgie

Een operatie aan je galblaas of galwegen waarbij de chirurg pijnlijke galstenen verwijdert

oorsprong vinden in je facetgewrichten. Dat zijn kleine zijgewrichtjes tussen je wervels.



Gedeeltelijke verdoving

regionale verdoving, regionale anesthesie, locoregionale verdoving, locoregionale anesthesie

Bij een gedeeltelijke verdoving maakt de anesthesist een bepaald deel van je lichaam gevoelloos of bewegingloos.



Gewrichtsprothese

Bij een gewrichtsprothese vervangen we je gewricht door een kunstgewricht. Mogelijke oorzaken zijn slijtage, een breuk, een aangeboren afwijking of het afsterven van het gewricht.



Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding helpt gezinnen om beter met elkaar om te gaan en problemen op te lossen door middel van gesprekken en oefeningen.



Glaucoomoperatie

glaucoomchirurgie

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.



Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Hallux is Latijn voor grote teen. Hallux-chirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP, unicondylaire prothese

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen door een kunstversie. In de meeste gevallen voelt dit aangenamer dan een volledig nieuwe knie.



Handrevalidatie

Bij een handprobleem zoals een breuk, reuma, een peesontsteking, een amputatie of een ziekte helpen we je om je hand opnieuw



Hartklepoperatie

hartoperatie

Om een lekkende of vernauwde hartklep te vervangen of repareren. Deze operatie gebeurt meestal via een kijkoperatie.

te leren gebruiken. We geven ook tips over economie.



Hartmedicatie

Om een hartziekte te behandelen of te voorkomen, schrijft de arts vaak medicatie voor. Er is o.a. bloeddrukverlagende, bloedverdunnende en cholesterolverlagende medicatie.



Hartmonitor

Een implantatie om de oorzaak van hartritmestoornissen of flauwvallen op te sporen. Het apparaat, ook wel 'implanteerbare looprecorder' genoemd, registreert elke hartritmestoornis.



Hartrevalidatie

cardiale revalidatie, cardiologische revalidatie

Bij cardiologische revalidatie leer je oefeningen om de conditie van je hart weer op te bouwen na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie.



HIPEC-chirurgie (Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie)

Een combinatie van chirurgie en chemotherapie om één of meerdere tumoren uit je buikholte te verwijderen.



Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie

Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.



HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



Hysterectomie

baarmoederverwijdering, baarmoeder weghalen

Een hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de arts de baarmoeder geheel of gedeeltelijk wegneemt.



Infiltratie

Infiltratie is een techniek waarbij een naald tot de bron van de pijn gaat. Daarna spuiten we een medicijn, ontstekingsremmer of pijnstillertje in. Dit kan je klachten verminderen.



Infiltraties bij het carpaletunnelsyndroom

inspuiting met ontstekingsremmers

Het carpaletunnelsyndroom omvat klachten in de hand en onderarm. We spuiten ontstekingsremmers in de pols om ontsteking en druk op de zenuw te verminderen.



Infiltraties bij meralgia paresthetica

inspuiting met ontstekingsremmers

Meralgia paresthetica is een beknelde zenuw in het bovenbeen. We spuiten ontstekingsremmers rond de heupkam om pijn te verlichten.



Infiltraties bij occipitalisneuralgie

inspuiting met ontstekingsremmers

Occipitalisneuralgie is een ziekte waarbij de zenuwen in de nek en achterkant van het hoofd ontstoken raken. We spuiten ontstekingsremmers rond de zenuw om pijn te verlichten.



Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheekunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



Ingrepen op de aorta

hartoperatie

Om problemen aan de aorta te behandelen, voert de arts een bentaloperatie, ingrepen aan de aorta ascendens en ingrepen op de aorta descendens uit.



Inhalatietherapie

Bij deze therapie adem je medicijnen in via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten.



Interventionele pijnbehandeling

interventionele pijntherapie, interventionele pijnbestrijding



Intrathecale pijnpomp

intrathecale pijntherapie, intrathecale morfiepomp

Bij deze behandeling krijg je via een pijnpomp medicijnen toegediend in de intrathecale ruimte. Dat is de ruimte rond je ruggenmerg waar ruggenmergvocht in zit.

Bij een interventionele pijnbehandeling richt



Inwendige en uitwendige neuscorrectie

septorhinoplastie

Bij een in- en uitwendige neuscorrectie veranderen we de vorm van je neus om de functie en/of het uitzicht van je neus te verbeteren.



Kijkoperatie borstkas

video-assisted thoracoscopic surgery, video-assisted thoracic surgery, VATS

Deze kijkoperatie is op dit moment de meest gebruikte techniek. Onder volledige verdoving (narcose) maakt de chirurg 1, 2 of 3 kleine sneetjes in de borstkas holte.



Kijkoperatie keel en strottenhoofd

pandendoscopie

Met een soort buis (scoop) bekijkt de arts je mond- en keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en slokdarm. Het doel is om verdachte weefsels op te sporen en te laten onderzoeken.



Kijkoperatie op het hart

hartoperatie

De arts opereert je hart via kleine gaatjes in plaats van 1 grote snee. Dankzij een fijne HD-camera ziet de chirurg het hart op een groot scherm.



Kinesithherapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



Kinesithherapie rond de bevalling

perinatale kinesithherapie, prenatale kinesithherapie, postnatale kinesithherapie

Met kinesithherapie maak je de spieren van je bekkenbodem weer sterker na een bevalling of bereid je je voor op de bevalling met oefeningen en ademhalingstechnieken.



Knieprothese op maat

maatprothese

Een knieprothese is een kunstknie. Bij een maatprothese wordt op basis van een CT-scan gekeken hoe de prothese best



Laserbehandeling voor oogandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.



Ligamenten vastzetten

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduim, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



Logopedie

De logopedist helpt je om goed te leren spreken, kauwen en slikken, bijvoorbeeld wanneer je herstelt van een neurologische aandoening.



Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.

gepositioneerd wordt volgens jouw

specifieke anatomie.



Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het schouderblad.



Littekencorrectie

Een operatie waarbij de chirurg het huidige litteken uitsnijdt en de opening opnieuw aan elkaar hecht.



Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.



Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.



Maagchirurgie

Een operatie aan je maag om bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren in je maag te verwijderen.



Maagverkleining maagpouch via slokdarm

Ook wel Transoral Outlet Reduction (TORe) genoemd.



Maagverkleining via de slokdarm

Ook endoscopische sleeve gastroplastiek of ESG genoemd. Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen.



Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



Microscopische discectomie

discotomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw aandrukt. De arts verwijdert de schijf om de druk te verlichten.



Middenoorinspectie

We bekijken en controleren de beweeglijkheid van de gehoorbeentjes en proberen je gehoor te verbeteren. Als er een gaatje in je trommelvlies zit, maken we dat ook dicht.



Neurologische revalidatie

Neurorevalidatie

Bij een aandoening aan je hersenen, zenuwstelsel of ruggenmerg helpen we je om je functies te herstellen of om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan.



Neurostimulatie

ruggenmergstimulatie, spinal cord stimulation (SCS), zenuwwortelstimulatie, dorsal root ganglion (DRG)

Een neurostimulator geeft via elektroden op je huid lichte elektrische impulsen in de ruimte rond je ruggenmerg en onderbreekt zo de pijnsignalen tussen je ruggenmerg en hersenen.



Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



Neustussenschotcorrectie

septumcorrectie, septoplastie

Het neustussenschot (septum) verdeelt je neus in 2 holtes. Bij een neustussenschotcorrectie zetten we het opnieuw recht zodat je weer beter door je neus kan ademen.



Niet-invasieve beademing

niet-invasieve ventilatie, thuisventilatie, non-invasieve ventilatie, NIV

Bij sommige aandoeningen is je lichaam niet meer in staat om op een juiste manier zuurstof op te nemen en koolzuur uit te ademen. Een thuisbehandeling kan mogelijk aangewezen zijn.



Oncologische slokdarmheelkunde

Een operatie aan je slokdarm om kwaadaardige tumoren in je slokdarm te verwijderen.



Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochtruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht (vitreum) van het oog om bepaalde netvliesaanomeningen te behandelen.



Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, bipten genomen van letsels in de oogkas of tumoren verwijderd.



Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dicht bij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd worden.



Operatie aan je lever

Je lever maakt gal, stollingsfactoren en eiwitten aan. Het zet ook voedingsstoffen om naar energie.



Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



Operatie bij endeldarm- of rectumkanker

De chirurg verwijdert operatief je endeldarm en het omliggende weefsel. Als de kwaadaardige tumoren naast je sluitspier liggen, dan neemt de arts ook je sluitspier en je anus weg.



Operatie bij hallux rigidus

operatie teenartrose, stijve grote teen opereren

Deze ingreep kan je laten uitvoeren wanneer je grote teen stijf is omdat het kraakbeen in het gewricht versleten is.



Operatie bij hallux valgus

hallux-valgus-operatie, operatie scheve grote teen

Een hallux-valgus-operatie is een ingreep die je kan laten uitvoeren als je grote teen scheef staat en pijnlijk is. De arts zet dan de botten van je teen weer recht.



Operatie borstkas (open heekunde)

Thoracotomie

Bij een thoracotomie maken artsen de borstkas open tussen de ribben, een klassieke toegang voor de behandeling van longkanker.



Operatie carpaletunnelsyndroom

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.



Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



Orthese

Een orthese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel beschermt of ondersteunt, zoals een korset of steunzolen. Het is niet hetzelfde als een prothese, dat een lichaamsdeel vervangt.



Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



Operatie tegen snurken en slaapapneu

uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Bij deze operatie verkleinen we het zachte gehemelte. In het geval van slaapapneu nemen we ook je keelamandelen weg.



Operatie van een ingegroeide teennagel

De chirurg behandelt en verwijdert operatief de ingegroeide teennagel.



Orthopedische revalidatie

Tijdens dit oefenprogramma bouwen we je kracht op, vergroten we de beweeglijkheid van je gewricht en verbeteren we de stabiliteit van het gewricht en lichaam.



Overbruggingsoperatie of bypassoperatie

hartoperatie

De arts legt overbruggingen met 1 of 2 borstslagaders en/of een ader uit het been als de kransslagaders ernstig vernauwd zijn.



Pacemaker

Een apparaat dat je hart altijd bewaakt. Als er een abnormaal hartritme optreedt, dan grijpt de pacemaker in door je hart een elektrische prikkel te geven.



PDT

Photodynamische therapie (PDT) is een behandeling waarbij we een lichtgevoelige crème op de huid aanbrengen en activeren met een rode lamp.



Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



Pijnbehandeling sacro-iliacaal gewricht

De pijnarts injecteert een kleine hoeveelheid verdovingsmiddel in je heiligbeengewricht (infiltratie) en behandelt het met radiofrequente stroom (RF-denervatie).



Parkinsonrevalidatie

Door de ziekte van Parkinson sterven er zenuwcellen af. Hierdoor kan je minder goed bewegen. Met Parkinsonrevalidatie leren andere, gezonde zenuwcellen om functies over te nemen.



Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.



Pijnbehandeling zonder medicijnen

niet-medicamenteuze pijnbehandeling

Er bestaan tal van behandelingen die je pijn kunnen helpen verlichten. Bespreek met je arts wat bij jou veilig is en mogelijk pijnverzachtend.



Pijnmedicatie

pijnmedicijnen, medicamenteuze of farmacologische pijnbehandeling of pijnbestrijding

Pijnmedicijnen kunnen je pijn verlichten of onderdrukken. Het is belangrijk ze juist te gebruiken: in de juiste dosis, juiste combinatie

te vorm



PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en plaatst een metalen pinnetje of een schroefje.



Pijnstilling na operatie

Een goede pijnbehandeling na de operatie draagt ertoe bij dat er zich minder complicaties voordoen, dat je je comfortabeler voelt en dat je sneller herstelt.



PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwtvormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwtvormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



Plexusverdooving

plexusanesthesie, plexusblokkade, zenuwverdooving, perifere zenuwblokkade, zenuwblock, zenuwblok

Bij een plexusblokkade verdooft de anesthesist een specifieke zenuw of bundel van zenuwen die naar je hoofd, nek, schouder, arm, hand, heup, been, voet of een deel ervan gaan.



POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.



Poliklinische zorg

Je kan bij UKJA terecht voor derdelijnsdiagnostiek en -advies. In het Referentiecentrum Autisme (RCA) worden kinderen en jongeren onderzocht op autismespectrumstoornissen.



Polsprothese

Bij een polsprothese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is.

Na de ingreep kan je minder, maar nog



Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Reconstructie voorste kruisband

Voorstekruisbandoperatie, operatie gescheurde kruisband, voorste kruisbandreconstructie, VBK

Bij deze operatie krijg je een nieuwe voorste kruisband in je knie, gemaakt uit andere pezen van je lichaam.



Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



Revalidatie in het ziekenhuis (SP-revalidatie)



Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.



Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



Redo-chirurgie

Aanpassingen van eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperaties.



Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.



Revalidatie na amputatie

SP-revalidatie betekent dat je verblijft in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of op een ziekenhuisafdeling die specifiek gericht is op revalidatie.



Revalidatie na bloedkanker

sport na een hematologische maligniteit

We hebben een bewegingsprogramma voor patiënten die herstellen van een kwaadaardige bloedziekte. De oefeningen helpen patiënten om zich beter, sterker en minder vermoeid te voelen.

Na een amputatie helpt een multidisciplinair team je om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om te gaan met het letsel en eventueel te wennen aan je prothese - als je er een hebt.



Revalidatie na een niet aangeboren neurologische aandoening (NAH)

NAH-revalidatie

Een hersenletsel kan plots ontstaan, bijvoorbeeld na een ongeval, beroerte of ziekte. Bij je revalidatie streven we naar herstel en helpen we je om te gaan met de beperkingen.



Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Robotchirurgie voor het plaatsen van een prothese

ROSA-robot, RObotic Surgical Assistant, operatierobot, robotgeassisteerde prothese

De ROSA-robot is een navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij het plaatsen van een prothese.



Rookstop

ZAS organiseert regelmatig rookstopcursussen in groep.



Rugrevalidatie

behandeling van rugpijn



Scaphoidectomie

Bij een scaphoidectomie verwijdert de arts het os scaphoideum. Dat is een van de acht

Rugrevalidatie is een vorm van ondersteuning bij terugkerende rugklachten. We trainen je spieren en leren je over ergonomie. We tonen je ook hoe je met de pijn kan omgaan.

kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



Schildklieroperatie

schildklierchirurgie, thyroïdectomie, wegname schildklier, verwijdering schildklier, schildklieringreep

Een operatie waarbij de arts je schildklier gedeeltelijk of volledig verwijdert. Je schildklier is een orgaan vooraan in je hals en zorgt voor de productie van hormonen in je bloed



Schouderprothese

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.



Schouderrevalidatie

Na een operatie of blessure aan je schouder is het belangrijk om goed herstellen. Tijdens dit traject leren we je om je schouder te ontlasten en nadien weer correct te gebruiken.



Sedatie

Met geneesmiddelen verlagen we je bewustzijn zodanig dat je een operatie of onderzoek niet als onaangenaam ervaart of er zelfs niets van merkt.



Shockwavetherapie

ESWT, shockwave, extracorporeal shockwave therapy, schokgolfterapie

ESWT of shockwavetherapie is een behandeling waarbij we met een apparaatje een schokgolf door een pees sturen. Hierdoor wordt die pees gestimuleerd om zichzelf te herstellen.



Single Anastomosis Duodenal-Ileal bypass (SADI)

De arts combineert een sleeve gastrectomie met een darmomleiding. Hij verwijdert het maagdeel met de hongersensoren en leidt je 12-vingerige darm en een deel van je dunne darm om.



Sinusoperatie

functionele endoscopische sinuschirurgie (FESS)



Sluiting linkerhartoor

Bij een sinusoperatie maakt de NKO-arts via je neus de doorgangen van je sinussen (neusbijholten) weer open.

De arts sluit het linkerhartoor met een plugje om een beroerte te voorkomen bij patiënten met een onregelmatige hartritmestoornis en die geen medicatie mogen nemen.



Spalk- of bracetherapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan spalken en braces voor je hand, pols en elleboog.



Spinale verdooving

Spinale ruggenprik, spinale anesthesie, lumbale anesthesie

Met een spinale ruggenprik verdooft de anesthesist de onderste helft van je lichaam.



Spinale-epidurale verdooving

combinatie spinale en epidurale verdooving, gecombineerde spinale-epidurale verdooving, spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde ruggenprik

De spinale ruggenprik verdooft de onderste helft van je lichaam. Daarna wordt er een katheter (zeer dun buisje) geplaatst voor de toediening van pijnmedicijnen.



Sport bij diabetes

Met ons bewegingsprogramma helpen we je als diabetespatiënt een actieve levensstijl aan te nemen én vol te houden. Met beweging houd je je bloedsuikerspiegel beter onder controle.



Sport na obesitaschirurgie

Dit is een bewegingsprogramma dat je kan volgen na een obesitasingreep. We proberen je gewichtsverlies te versnellen en leren je om te sporten op een manier die je kan volhouden.



Starten met medicatie bij IBD

IBD-aandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan je behandelen met medicatie zodat je minder last hebt van je klachten. Je arts adviseert je hierbij.



Stembandoperatie

microlaryngoscopie



Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.

Bij een stembandoperatie neemt de NKO-arts afwijkingen op je stembanden weg, bijvoorbeeld een poliep (goedaardige zwelling) of een cyste (blaasje gevuld met vocht).



Stent-implantatie

De arts plaatst stents om de vernauwing(en) van de kransslagaders open te maken. Een stent is een klein metalen veertje dat de kransslagader ophoudt.



Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.



Stijgbeugeloperatie

stapedotomie, stapeschirurgie

We nemen het bovenste gedeelte van de aangetaste stijgbeugel (1 van de 3 gehoorbeentjes in je oor) weg en plaatsen een prothese die de geluidsgolven doorgeeft aan het binnenoor.



Subtalaire arthrodesese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



Tenodermodese

Tenodermodese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de



Therapeutische hysteroscopie

Kijkoperatie baarmoeder

operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.

Bij een therapeutische hysteroscopie kijkt de arts in de baarmoeder met een camera en voert ook meteen een ingreep uit. De camera zit op een buis die we inbrengen via de vagina.



Therapeutische laparoscopie

Kijkoperatie buikholte

Bij een therapeutische laparoscopie brengt de arts een camera en instrumenten in via sneetjes in de buik. Dat is minder ingrijpend dan een openbuikoperatie.



Totale heupprothese

kuntheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een kunstversie.



Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij deze prothese vervangt de arts het volledige kniegewricht door een kunstversie. Dat is anders dan bij een halve knieprothese, die maar een deel van het kniegewricht vervangt.



Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de traanzak en de neusholte. Zo kunnen de tranen weer via de neus worden afgevoerd.



Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

De cardioloog implanteert een nieuwe biologische hartklep als de aortaklep ernstig vernauwd is.



Transcutane elektrische neurostimulatie

TENS

Via elektroden op je huid stuurt het TENS-toestel elektrische prikkels naar je zenuwen. Het is een niet-ingrijpende methode om (chronische) pijn te verlichten zonder medicatie.



Transforaminale epidurale infiltratie



Trapezectomie met het ligamentreconstructie

De pijnarts plaatst na lokale verdoving in je lage rug een fijne naald tot in de epidurale ruimte in je wervelkolom en spuit daar pijnstillende medicatie in.

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.



Triple arthrodese

Een triple arthrodese is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



Trommelvliesbuisjes

plaatsing diabolos

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.



UV-therapie bij huidziekten

Ultravioletbestraling of UV-therapie werkt met een lichtcabine waarin je plaatsneemt.



Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



Verwijderen van een polscyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht



Vingeramputatie

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan

gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.



Volledige verdoving

Algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose

Bij een algemene verdoving wordt je hele lichaam verdoofd. Via een infuus krijg je slaapmiddelen toegediend waardoor je in een kunstmatige slaap valt.

wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



Vroegtijdige zorgplanning voor ouderen

Met een geriater, ergotherapeut, psycholoog en sociaal werker kan je over de toekomst van je leven, de zorg die nog je wil en je levenseinde spreken.



Wegname halsscyste

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halsscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.



Wegname halsfistel

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.



Wegname onderkaakspeekselklier

wegname glandula submandibularis, submandibulaire speekselklierwegname

Wegname van de volledige onderkaakspeekselklier kan nodig zijn bij chronische ontsteking (met steenvorming) of



Wegname oorspeekselklier

wegname glandula parotis, parotidectomie

Oppervlakkige of totale wegname van de oorspeekselklier kan nodig zijn bij gezwellen van de oorspeekselklier zoals het pleiomorf

als er goedaardige of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn.

adenoom en het adenolymfoom (Warthin-gezweel).



Wegname strottenhoofd

laryngectomie

Bij een laryngectomie nemen we je strottenhoofd (larynx) weg. De reden daarvoor is in de meeste gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).



Weke delen operatie

Dat zijn weefsels onder je huid die zich o.a. rond je organen, spieren en botten bevinden. De chirurg opereert bij o.a. huidletsels, lipomen, cysten, melanomen en sarcomen.



Zenuwwortelblokkade

Bij een zenuwwortelblokkade verdooft de pijnarts een zenuwwortel om je pijn te verminderen. Dat kan ter hoogte van je nek, borst of onderrug.



Zuurstoftherapie bij longaandoeningen

Via je neus of mond krijg je extra zuurstof. Daardoor moeten je longen en je hart minder hard werken.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-hoge-beuken>