



ZAS Sint-Jozef

Algemene informatie

☎ 03 444 12 11

✉ gza.sj.onthaal@zas.be

Bezoekuren

Elke dag van 14 tot 20 uur

Palliatieve eenheid (route 211): elk moment van de dag

OVER

ZAS Sint-Jozef

Campus Sint-Jozef is een algemeen ziekenhuis met 96 bedden.

ZAS Sint-Jozef spitst zich toe op (psycho)geriatrie, inwendige (dag)hospitalisatie en ambulante en gehospitaliseerde revalidatie. Ook de diabetische voetkliniek en de MS-kliniek zijn hier gehuisvest. Verder kunnen patiënten in hun laatste levensfase aangepaste zorg ontvangen in een warme en huiselijke sfeer in de palliatieve afdeling.

Eerste hulp

Alle dagen open van 7.30 - 21.30 uur

Ook in het weekend en op feestdagen

Je hebt geen afspraak nodig.

De eerste hulp van ZAS Sint-Jozef is gespecialiseerd in kleinere letsels die dringend zorg nodig hebben en waarvoor je niet bij de huisarts terecht kan. Denk aan breuken, verstuikingen, gewrichten uit de kom of snijwonden.

Voor meer gespecialiseerde spoedzorg werken we nauw samen met onze andere campussen. Zo kunnen we je na de eerste opvang snel laten opnemen in 1 van de **6 gespecialiseerde spoeddiensten van ZAS**. Daarna kan je tijdens je herstelperiode op consultatie komen in ZAS Sint-Jozef. Dit kan enkel op afspraak.

Heb je **dringende hulp nodig van 21.30 tot 7.30 u**? Ga naar de dichtstbijzijnde spoeddiensten van ZAS: **ZAS Augustinus** of **ZAS Middelheim**.

Vragen? Contacteer 03 444 13 10.

Huisartsenwachtpost

De campus huisvest sinds 2019 **huisartsenwachtpost ZORA**, wat staat voor ZuidOostRand Antwerpen. Daar kan je terecht tijdens het weekend of op feestdagen wanneer je een dringend medisch probleem hebt dat niet kan wachten tot je eigen huisarts weer beschikbaar is. De huisartsenwachtpost ZORA is een samenwerking tussen ZAS en huisartsenkring Mortsel. Contactgegevens, openingsuren en andere informatie vind je op [hun website](#).

Bereikbaarheid



Dit is een rookvrije campus

Deze campus is **volledig** rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones.

Met de auto

Het adres van ZAS Sint-Jozef is Molenstraat 19, 2640 Mortsel.

Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.



Mogen huisdieren mee naar binnen?

- Door werken aan het kruispunt Molenlei met Molenstraat kan je tijdelijk hinder ondervinden om ons ziekenhuis te bereiken. Raadpleeg [de website van het Agentschap Wegen en Verkeer](#) voor meer informatie.
- De werken lopen van 6 januari tot midden februari.

Hulphonden vormen een uitzondering op die regel: zij zijn op alle afdelingen welkom.

Parking

Vanaf 1 februari 2022 gelden volgende tarieven:


- € 2,00 voor het eerste uur.
- € 1,50 voor elke bijkomend uur, met een maximum van € 10 per dag.
- Een tienbeurtenkaart voor bezoekers kost € 25,00.
- Als je het parkeerterrein binnen de 15 minuten verlaat, hoef je niet te betalen. Je moet het ticket nog wel valideren in de betaalautomaat.
- Verlies je je ticket, dan betaal je € 10,00.

Met het openbaar vervoer

ZAS Sint-Jozef is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

- **Gebruik Google Maps.**

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- **Gebruik de routeplanner van De Lijn**
- **Plan je treinreis op de website van NMBS**

Bereken je route

✕
📍

Wandelaafstand
▼
5 min
▼

📍 Geef me reisadvies

Filters en lagen
▼

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner omvat. Deze widget maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van de widget om die verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar Antwerpen opslaat zijn:

- Hoe vaak wordt er op de knoppen 'toon op kaart' en 'geef me reisadvies' geklikt binnen de widget?
- Vanuit welke site wordt er op deze knoppen geklikt binnen de widget?

Als je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens, kan je altijd de Data Protection Officer van ZAS Antwerpen contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Voorzieningen

🍴 Horeca			
	Wat?	Waar?	Openingsuren
Bezoekerscafetaria	Koude en warme dranken, snacks, belegde	Op het gelijkvloers, wandel rechtdoor aan de	Maandag tot vrijdag 12 uur tot 15 uur

	broodjes en warme gerechten	hoofdingang, je komt de cafeteria tegen aan de rechterkant	Gesloten op zaterdag en zon- en feestdagen
--	-----------------------------------	---	---

Is de cafeteria gesloten? In onze campus vind je op verschillende plaatsen automaten met koude en warme dranken. Daar kan je dag en nacht terecht voor een verfrissing.

Winkel

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Cafetariashop	Kleine geschenken	Op het gelijkvloers. Wandel rechtdoor van de hoofdingang, je komt de cafeteria tegen aan de rechterkant	Maandag tot vrijdag 12 uur tot 15 uur Gesloten op zaterdag en zon- en feestdagen

Wifi/telefoon/televisie

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. Vraag vooraf om een telefooncode bij de opnamedienst. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

Kapel

Wil je even rust opzoeken? Bezoekers en patiënten zijn in ZAS Sint-Jozef steeds welkom in de kapel voor een moment van bezinning of gewoon om even op adem te komen.

De kapel bevindt zich op het gelijkvloers, links van de hoofdingang. Je kan er terecht op weekdays van 8 uur tot 20 uur.

Lees gratis online stripverhalen

Standaard Uitgeverij biedt via STRIPS.BE onze patiënten en bezoekers gratis en onbeperkt stripverhalen aan om te lezen op ons ZAS-netwerk. Ideaal als afleiding of om wachttijden wat sneller voorbij te laten gaan.

STRIPS.BE is een streamingplatform met een catalogus van duizenden stripverhalen: van De Kiekeboes, Suske en Wiske, Jommeke, Camille, De Blauwbloezen ... Voor jong en oud!

Hoe werkt het?

1. Verbind met het wifinetwerk van ZAS
2. Download de app STRIPS.BE op je smartphone of tablet (hier app-logo bijzetten)
3. Klik op het ZAS-icoon
4. Start met lezen!

Enkel voor patiënten

Terras

Nood aan een frisse neus? Op mooie dagen kunnen bezoekers en patiënten buiten zitten op het gezellige terras van onze cafetaria.

Kapper en pedicure

Nood aan een moment zelfzorg? In ZAS Sint-Jozef kan je tijdens je verblijf je haar laten knippen of een ontspannende voetverzorging krijgen.

De kapper in ZAS Sint-Jozef knipt steeds op woensdag en komt tot bij jou op de kamer. Zo kan iedereen, ook de minder mobiele patiënten, genieten van een

knipbeurt.

Een afspraak maken voor de kapper of pedicure doe je via de verpleging op de afdeling. Je betaalt via de ziekenhuisfactuur.

Wasdienst

Vraag ernaar bij je verpleegkundige.

Kluisjes

In ZAS Sint-Jozef hebben alle kamers een kluis. Daarin kan je jouw persoonlijke spullen veilig achterlaten.

Diensten

 Filter deze pagina

1 - 9 van 32



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Expertisecentrum


Dagcentrum Ikaria

dagverzorgingscentrum,
dagverzorging, dagopvang



Dienst

Diëtisten



Dienst

Endocrinologie

voedingsadvies,
voedingsconsultatie

hormoonziekte, suikerziekte,
diabetes, obesitas, bijnier,
hormonen, schildklier, hypofyse,
calciumproblemen



Dienst


Endocrinologie voor kinderen

kinderhormoonziekten, kinderen
met hormoonproblemen



Expertisecentrum

Expertisecentrum voor complexe pancreaschirurgie



Dienst

Fysische geneeskunde en revalidatie



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten



Dienst

Geriatric

Ouderdomsgeneeskunde,
Ouderengeneeskunde

Onderzoeken

[Filter deze pagina](#)

1 - 95 van 95



onderzoek hormonale stoornissen

Via bloed- en urineonderzoek wordt gekeken of er stoornissen zijn in je hormonenstofwisseling, zoals bijvoorbeeld afwijkingen in de (bij)schilddklier, hypofyse of bijnier.



24 uurs-EEG

24 uurs-elektro-encefalogram

Deze test meet 24 uur lang de hersenactiviteit om problemen op te sporen die we in korte tests niet altijd vinden. We kijken hoe de hersenen werken, ook tijdens de slaap.



24-uurs urinecollectie

Om in te schatten hoeveel de nieren nu precies van een bepaalde stof uitscheiden, kan het zinvol zijn om de urine van een volledige dag en nacht op te sparen en te onderzoeken.



6 minutenwandeltest

zesminutenwandeltest, 6MWT

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen 6 minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je hartslag.



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest, uitlokkings-test, provocatietest



Artrografie

Artrografie is een onderzoek waarbij we contrastvloeistof in een gewricht injecteren en er daarna röntgenbeelden van maken.

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.



BAEP-onderzoek

brainstem auditory evoked potential (BAEP)

BAEP kijkt hoe je hersenen reageren op geluiden. De test helpt om gehoor- en zenuwproblemen in de hersenstam te ontdekken.



Beeldvorming bij (vermoeden van) kanker

Bij de diagnose en ook tijdens de behandeling en opvolging van vaste tumoren zijn meestal regelmatige beeldvormingsonderzoeken aangewezen.



BERA-onderzoek

brainstem evoked response audiometrie, auditory brainstem response (ABR)

Met deze objectieve gehoortest meten we het gehoor tot op het niveau van de hersenstam (hersenstamaudiometrie).



Biopsie arteria temporalis

Bij een temporalis biopsie halen we onder lokale verdoving een klein stukje van 2 tot 4 cm weg uit een bloedvat bij de slaap.



Blaasfunctieonderzoek

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De uroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



Bloedgasanalyse

bloedgasbepaling, arteriële bloedgasbepaling, arteriële bloedgasanalyse, arteriële bloedpunctie, arteriepunctie

We nemen een bloedstaal uit de slagader in je pols om o.a. het zuurstof- en koolzuurgasgehalte in je bloed te meten. Zo komen we te weten hoe goed je longen functioneren.



Bloedonderzoek bij reuma

In dit onderzoek bekijken we de waarden van de verschillende stoffen in het bloed. Abnormaal hoge of lage waarden of



Bloedonderzoek bij vaste tumoren

Bij de diagnose, tijdens en na de behandeling van kanker gebeurt regelmatig een bloedonderzoek. Dat is nodig om de impact

specifieke biomarkers kunnen wijzen op benaalde aandoeningen.



Bloedonderzoek om mucoviscidose op te volgen

Met een bloedonderzoek kunnen we bij mucopatiënten de werking van de nieren, lever en alvleesklier nagaan en de hoeveelheid vitamines meten.

van de ziekte en therapie op het lichaam na te gaan.



Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



Botmeting

botdichtheidsmeting, botdensitometrie (BMD), bone mineral content (BMC), Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA of DEXA), DXA-scan, DEXA-scan

Met dit onderzoek meten we de botdensiteit of het kalkgehalte in je bot. Zo kunnen we zien of je osteoporose hebt en of je een verhoogd fractuurrisico hebt.



Capillaroscopie

nagelriemonderzoek

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld.



Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.



CT-scan

computertomografie

Een CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden van je lichaam. Om het contrast tussen de verschillende weefsels te vergroten, krijg je vaak een contrastmiddel toegediend.



Diagnostische hysteroscopie

Kijkonderzoek baarmoeder

Bij een diagnostische hysteroscopie kijken we in de baarmoeder met een kleine camera die



Diagnostische laparoscopie

kijkonderzoek buikholte

Een diagnostische laparoscopie is een kijkonderzoek van de buikholte. De arts

we inbrengen via de vagina. Zo kan de arts afwijkingen in de baarmoeder opsporen.



Doppleronderzoek

dopplertechniek, kleurendoppler, kleurendoppler-echografie

Met de dopplertechniek worden naast de grijswaarden van het echografisch onderzoek ook kleuren afgebeeld en hoorbare geluiden geproduceerd.

brengt een kleine camera in om je buikholte of organen te bekijken.



Duplex arteria temporalis

Bij dit onderzoek maken we gebruik van 2 technieken die werken met geluidsgolven: echografie en doppler. We kijken naar de slagader aan de zijkant van het hoofd bij de slaap.



Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



Duplexonderzoek craniale bloedvaten

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten van je hoofd en rond je oksel onderzocht bij vermoeden van ontsteking van de bloedvaten (arteritis temporalis).



Echo-endoscopie

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je spijsverteringskanaal. Soms nemen we weefsel af voor onderzoek.



Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie borstkas

echografie thorax

Met dit onderzoek kan je longarts met onhoorbare (ultrasone) geluidsgolven



Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden (schrompelnieren)? Zijn er niercysten?

afwijkingen opsporen in je borstkas zoals

ophopingen.



EEG

elektro-encefalogram

EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.



Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek,
elektromyografisch onderzoek,
zenuwgeleidingsonderzoek

Met een electromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het hoort.



Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS)
TransBronchial Needle Aspiration (TBNA)

Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.



Endocriene functietesten

We kijken of de endocriene klieren goed functioneren, bv. schildklier of bijnier. We dienen jou een stof toe en kijken hoe je daarop reageert door bloed-, urine- en/of zweettesten.



Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.



Erfelijkheidsonderzoek bij kanker

genetisch onderzoek bij kanker, DNA-onderzoek bij kanker



Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de

Genetisch onderzoek kan aantonen of het voorkomen van kanker in jouw familie al dan niet erfelijk bepaald is. Bij 5 tot 10 % van alle mensen met kanker is dat het geval.

evenwichtsorgaantjes in je binnenoor en geven we de werking van je evenwichtssysteem weer in grafieken.



Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.



Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftrillingen (toonhoogte).



Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP), Goldmann gezichtsveldonderzoek

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



Huidtesten voor medicatie-allergie

huidtest voor medicijnallergie, huidtest voor geneesmiddelenallergie, huidpriktest voor medicatie-allergie, huidtest met geneesmiddelen, allergietest medicatieovergevoeligheid

We controleren of je huid reageert op een kleine, verdunde hoeveelheid van een specifiek medicijn.



Hyperventilatie-test



Internistisch onderzoek

De longarts vraagt je om in een sneller tempo te ademen om het koolzuur in de uitgeademde lucht te kunnen meten. De test dient om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen.



Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.

Bij dit onderzoek bekijken we het lichaam in zijn geheel en niet een specifiek onderdeel. Hierbij maken we soms ook gebruik van bloed-, urine- of andere onderzoeken.



Jaaronderzoeken diabetes

Jaaronderzoeken zoals oogfundus-, urineonderzoek en EKG helpen om problemen vroeg te ontdekken, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.



Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie, cystoscopisch onderzoek

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas. Dat gebeurt onder lokale verdoving.



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Kijkoperatie longvliezen

endoscopie longvliezen, pleuroscopie

Bij een pleuroscopie kijkt je arts met een kleine camera of pleuroscop naar je longvliezen (pleurabladen). Je bent hierbij verdoofd, maar je blijft zelf ademen.



Kleurstofffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo



Klinisch onderzoek orthopedie

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



Klinisch onderzoek reumatologie

Bij dit onderzoek onderzoeken we je van kop tot teen waarbij het bewegingsstelsel meestal centraal staat. Soms komen er bijkomende evaluaties van het hart, de longen, enz. bij.



Lactose-intolerantietest

lactose-blaastest, waterstof-ademtest

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.



Leverbiopsie

leverpunctiebiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.



Longfunctieonderzoek

longfunctietest

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Longpunctie

punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.



Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.



Mammografie

röntgenfoto borsten



MEP

motor evoked potential

Een mammografie brengt met röntgenstralen het borstweefsel in beeld. Het onderzoek dient om borstletsels op te sporen en op te volgen. Het duurt ongeveer een kwartier.

MEP kijkt hoe je spieren reageren wanneer de hersenen magnetisch worden gestimuleerd. Zo kunnen we zien hoe goed je zenuwen en spieren werken.



Microscopisch onderzoek

micro-otoscopie

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



Muscoskeletale echografie

MSK-echografie

Bij dit onderzoek stuurt een toestelletje geluidgolven door je lichaam. Die weerkaatsen op je spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten, waardoor we ze zien op een scherm.



Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



Neusdoorgankelijkheidstest

rhinomanometrie

Bij een rhinomanometrie meten we hoeveel lucht er door je neus gaat als je in- en uitademt. Zo achterhalen we de weerstand en in welke mate er sprake is van een verstopping.



Neuspotentiaal meting

NPD-meting

Zout bestaat uit de stoffen natrium en chloor. De arts kan die meten in de neus om te onderzoeken hoe in het lichaam zout van de ene cel naar de andere gaat.



Nierbiopsie

nierweefselonderzoek



NMR

Nucleaire Magnetische Resonantie

Bij een nierbiopsie nemen we onder plaatselijke verdoving een klein stukje nierweefsel weg voor onderzoek onder de microscoop.

Een NMR-scan maakt gedetailleerde beelden van binnen in het lichaam. NMR werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven



NO-meting

FeNO-onderzoek

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de lucht die je uitademt. Zo kunnen we luchtwegontstekingen en gevoelheden van je luchtwegen opsporen.



Onderzoek van urine

Afwijkingen in de urine, zoals de aanwezigheid van eiwit of bloed, kunnen wijzen op een ziekte van de nieren.



Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatie-tonometer of met een 'luchtpuf' (luchtonometrie of pneumotonometrie).



Oogonderzoek bij kinderen

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en onderzoeken het hoornvlies, de lens, de oogzenuw en het netvlies.



Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.



Plaskalender

mictielijst



Prostaatbiopsie

biopsie prostaat, prostaatweefselonderzoek, transperineale prostaatbiopsie, MRI-geleide prostaatbiopsie

Als je vaak moet plassen kan de uroloog veel informatie halen uit een plaskalender. Je houdt daarvoor 3 dagen en 3 nachten bij hoeveel je drinkt en meet je plasvolumes op.

Als je mogelijk prostaatkanker hebt, neemt de uroloog met een holle naald stukjes weefsel uit de prostaat om te laten onderzoeken.



Provocatietest voor bronchiale hyperreactiviteit

histamineprovocatietest, metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de gevoeligheid van je luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine of metacholine in, een prikkelende maar onschadelijke stof.



PSA-meting

PSA-onderzoek, PSA-test

PSA (prostaat specifiek antigeen) is een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt. Met een bloedonderzoek kan je arts de hoeveelheid PSA in je bloed meten.



Röntgenonderzoek

radiografie, RX, RX-onderzoek, conventionele radiologie, röntgenfoto

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en structuren van je lichaam zichtbaar. Soms krijg je eerst een contrastmiddel toegediend.



Rugpijn onderzoeken

Een onderzoek om je rugpijn in kaart te brengen en eventueel een behandelplan op te stellen.



Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.



Slokdarmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.



Spermaonderzoek na sterilisatie

Met dit onderzoek controleren we of een sterilisatie gelukt is. Als de zaadleiders



Sputumtest

Voor de behandeling van luchtweginfecties moeten we weten welke bacteriën in je

succesvol afgesloten zijn, mogen er geen bewegende zaadcellen meer in het sperma aanwezig zijn.

luchtwegen zitten. Daarom laten we regelmatig fluimen (sputum) onderzoeken in het laboratorium.



SSEP

somato sensory evoked potential

SSEP test hoe je hersenen reageren op aanraking. We kijken dan hoe snel die gevoelsprikkels je hersenen bereiken.



Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd,
kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



Transcraniële duplex

Transcraniële duplex is een neurologische test met geluidsgolven om te kijken hoe het bloed in je hersenen stroomt en om problemen in je bloedvaten te vinden.



Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening,
baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan op termijn tot baarmoederhalskanker leiden.



Urinecytologie

Een urinecytologie geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen in je urine.



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van je plasstraal te meten. Je plast daarvoor in een flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.



Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige gynaecologische echografie



VEP

visual evoked potentials

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.

VEP bekijkt hoe je hersenen reageren op flitsen of patronen. Zo controleren we of er problemen zijn bij het zien.



Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

Behandelingen

≡ Filter deze pagina

1 - 260 van 260



Aansluiten dialyse-apparaat

Er bestaan verschillende manieren om dialysepatiënten aan te sluiten op een dialyse-apparaat. Dit kan met een fistel of een katheter.



Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie



Alvleesklierchirurgie of pancreaschirurgie

pancreasoperatie, operatie aan de alvleesklier

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesithérapie of een operatie.

Bij bepaalde aandoeningen aan de pancreas maakt een operatie deel uit van de behandeling, meestal om de aangetaste delen van de pancreas weg te halen.



Amandeloperatie

tonsillectomie

Bij een amandeloperatie neemt de NKO-arts via je mond je amandelen (tonsillen) weg.



Analgetica

Analgetica zijn medicijnen die gebruikt worden om pijn te verzachten of weg te nemen. Ze werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale zenuwstelsel.



Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



AR-chirurgie voor het plaatsen van een prothese

augmented reality, AR-operatie, NextAR, AR-ingreep

Bij AR-chirurgie ziet de chirurg tijdens de ingreep zowel de operatietafel als informatie uit een CT-scan door een AR-bril. De arts hoeft niet weg te kijken tijdens de operatie.



Armlift

Een armlift is een ingreep om slappe of loshangende huid aan de binnenkant van de bovenarmen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.



Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht



Arthroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.

Een artroscoopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Artroscoopie knie

kijkoperatie knie, arthroscopie knie

Een artroscoopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het kniegewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



Artroscoopie schouder

kijkoperatie schouder, arthroscopie schouder

Een artroscoopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de schouder vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Artroscoopie van de heup

kijkoperatie heup, arthroscopie heup, heupartroscoopie

Een artroscoopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het heupgewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



Bandje tegen urineverlies bij vrouwen

netje tegen urineverlies, tape tegen urineverlies, suburethrale sling, urethrasling, TVT, TVT-O, TOT

De uroloog plaatst een smal strookje synthetisch materiaal onder de plasbuis (urethra). Dat ondersteunt de plasbuis en gaat urineverlies tegen.



BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.



Behandeling astma

Dikwijls is een behandeling met een puffer nodig. De arts en/of verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik ervan.



Behandeling blaaskanker



Behandeling bronchiëctasieën

Bij blaaskanker zijn naast een operatie soms ook blaasspoelingen, chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling COPD

behandeling chronisch obstructief longlijden,
behandeling chronisch obstructieve longziekte,
behandeling chronic obstructive pulmonary disease

De behandeling van COPD steunt onder andere op rookstop, inhalatietherapie, voldoende beweging, vaccinaties, regelmatige opvolging en longrevalidatie.

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het voorkomen van infecties.



Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.



Behandeling erectiestoornissen

Je leert een gezonde levensstijl ontwikkelen met voldoende beweging. Indien nodig schrijft de uroloog medicijnen voor. In heel specifieke gevallen is een penisprothese een optie.



Behandeling goedaardige prostaatvergroting met medicijnen

medicamenteuze behandeling goedaardige prostaatvergroting

Je kan medicijnen krijgen die plasklachten verbeteren en/of je prostaat verkleinen.



Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.



Behandeling hydrocoele bij volwassenen

behandeling hydrocoele, behandeling vochtophoping in de balzak, behandeling waterbreuk, herstel waterbreuk, herstel zwelling in de balzak, hydrocoeleherstel, operatie hydrocoele, hydrocoelecorrectie, hydrocoeleresectie, hydrocoele communicans

Hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee vliezen rond de teelbal. Daardoor zwelt de balzak op. Tijdens een operatie kan de uroloog dat vocht wegnemen.



Behandeling hypersensitiviteitspneumonitis

Soms kan stoppen van de oorzakelijke medicatie of ingeademde stof voldoende zijn maar vaak zijn immuunonderdrukkende



medicijnen nodig.

Behandeling klaplong

behandeling pneumothorax

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de soort en ernst van de klaplong. Soms is het nodig om een drain te plaatsen of een kijkoperatie uit te voeren.



Behandeling interstitieel longlijden

Medicijnen kunnen de ontstekingen in je longen onderdrukken. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt af van de oorzaak. Je



longarts zal je meer uitleg geven.

Behandeling longembolie

behandeling longembool, behandeling bloedklonter in longslagader, behandeling bloedstolsel in longslagader, behandeling afsluiting longslagader, behandeling trombose in de longen, behandeling Pulmonary Embolism (PE)

Een longembolie kan behandeld worden met bloedverdunners of antistollingsmiddelen. Andere behandelopties zijn de bloedklonter wegzuigen of via een operatie wegnemen.



Behandeling longhypertensie

De behandeling van longhypertensie hangt af van de oorzaak, de ernst en de aanwezigheid van andere ziekten. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwel, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling longontsteking

behandeling pneumonie

Een longontsteking kan meestal goed behandeld worden met antibiotica. Soms is een specifieke gerichte behandeling nodig.



Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



Behandeling met fillers

Een filler is een vloeibare gel die we gebruiken om diepe rimpels of groeven te verminderen, volume toe te voegen of de vorm van het gelaat te verbeteren.



Behandeling mucoviscidose

Bij mucoviscidose volgen we nauwgezet problemen met de longen en de spijsvertering op.



Behandeling nierkanker

Bij nierkanker zijn naast een operatie soms ook doelgerichte therapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling pleuravocht

Je longarts plaatst een naald of een slangetje (thoraxdrain) tussen je ribben om het opgehoopte vocht tussen je longvliezen weg te halen.



Behandeling prostaatkanker

Mogelijke behandelingen voor prostaatkanker zijn actieve opvolging, een operatie, radiotherapie en hormoontherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling sarcoïdose

Meestal gaat de ziekte vanzelf over. Soms is medicatie nodig om het immuunsysteem te onderdrukken.



Behandeling spermatocele

behandeling spermatocele, operatie spermatocele, operatie bijbalsyste, operatie epididymiscyste, wegname bijbalsyste, spermatocelectomie

Een spermatocele is een cyste van de bijbal (ligt tegen de teelbal). Tijdens een operatie kan de uroloog de cyste wegnemen.



Behandeling teelbalkanker

Bij teelbalkanker zijn naast een operatie soms ook chemotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling teelbaltorsie bij volwassenen



Behandeling tuberculose

behandeling torsio testis, behandeling teelbaldraaiing

De uroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.

Als je tuberculose hebt, kan je in principe volledig genezen met antibiotica.



Behandeling urineverlies bij mannen

behandeling urine-incontinentie bij mannen

Mogelijke opties zijn levensstijlaanpassingen, bekkenbodemspieroefeningen, medicatie en/of de plaatsing van een male sling of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling urineverlies bij vrouwen

behandeling urine-incontinentie bij vrouwen

Mogelijke opties zijn bekkenbodemkine, medicatie en/of de plaatsing van een 'bandje' of 'sling' (suburethrale sling) of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



Behandeling van spataders

behandeling van varices

Via een echo controleert de dokter de doorstroming in de bloedvaten en worden spataders zichtbaar. Een behandeling is mogelijk met of zonder operatie.



Behandeling varicocoele bij volwassenen

behandeling varicocele, behandeling spatader aan de teelbal

Varicocoele is een spatader ter hoogte van de teelbal. De meest courante behandeling gebeurt bij de radioloog. Die maakt het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.



Behandeling vernauwing beenslagader

percutane transluminale angioplastie, PTA, ballondilatatie, dotteren

De meest gebruikte behandeling bij een vernauwde beenslagader is een angioplastie of dotterbehandeling. Met een ballonnetje maakt de chirurg het vernauwde bloedvat weer open.



Behandeling vernauwing plasbuis

urethrotomie, Sachse urethrotomie, urethroplastie

De uroloog kan meestal de vernauwing in je plasbuis met een kijkinstrument openmaken (urethrotomie). In zeldzame gevallen is een uitgebreidere open operatie nodig (urethroplastie).



Behandeling vernauwing urineleider bij volwassenen

ureter-reïmplantatie, heraanleg urineleider in de blaas, herstel vernauwing urineleider

Bij een vernauwing van de aanhechting van de urineleider en de blaas maakt de uroloog de urineleider los van de blaas en maakt die op een andere plaats terug vast aan de blaas.



Behandelschema's medicijnen voor gynaecologische tumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



Behandelschema's medicijnen voor urologische tumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



Bekkenbodempkinesithherapie

bekkenbodempkinesithherapie, bekkenbodempkine, bekkenbodempkinesiotherapie, bekkenbodempkinesiotherapie, bekkenbodempkinesiotherapie, pelvische reëducatie

Met bekkenbodempkinesithherapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodempkinesen.



Bekkenbodempoperatie

Een operatie aan je bekkenbodem om bijvoorbeeld incontinentie of een endeldarmverzakking te behandelen.



Bewegingsprogramma bij de ziekte van Bechterew

spondylitis ankylosans revalidatie

Bij de ziekte van Bechterew zijn je gewrichten in je rug zo lang ontstoken, dat ze stijver



Bewegingsprogramma bij kanker

oncologisch bewegingsprogramma, oncologische revalidatie, oncorevalidatie

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je

worden en niet meer goed kunnen bewegen. Gerichte oefeningen kunnen dan helpen.

lichaam. Met ons bewegingsprogramma helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen.



Bijnierchirurgie

Ook wel adrenalectomie genoemd. De arts verwijdert operatief één of beide bijnieren. Je bijnieren zorgen voor een goede bloeddruk en produceren verschillende hormonen.



Billift

gluteale lift

Bij een billift wordt de overtollige huid ter hoogte van de billen aangespannen. We kunnen ook het volume van de bil vergroten met je lichaamseigen vetweefsel.



Biologicals en biosimilars

Biologicals zijn medicijnen die heel specifieke signaaleiwitten uitschakelen en zo ziekteprocessen (zoals reumatoïde artritis, psoriasis of inflammatoire darmziekten) beïnvloeden.



Blaassonde

blaaskatheter

Er bestaan twee soorten blaassondes. Een transurethrale blaassonde wordt via je plasbuis in je blaas ingebracht. Bij een suprapubische blaassonde gebeurt dat via je buikwand.



Blaasspoeling

blaasinstillatie, blaasspoeling met Bacillus Calmette-Guérin (BCG), BCG-spoeling, BCG-instillatie, blaasspoeling met Epirubicine, Epirubicine-spoeling, Epirubicine-instillatie

Om te verhinderen dat blaaspoliepen terugkomen of verergeren, krijg je medicijnen toegediend in je blaas. De uroloog bepaalt hoeveel blaasspoelingen in jouw geval nodig zijn.



Blaasverwijdering

wegname blaas, radicale cystectomie met Bricker urostoma of neoblaas, robot geassisteerde radicale cystectomie, RARC

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog je blaas weg en zorgt ervoor dat de urine kan afvloeien via een urostoma of een nieuwe blaas.



Borstlift

mastopexie



Borstvergroting

borstaugmentatie, augmentatieve mammoplastiek

Bij een borstlift herstellen we de positie en vorm van de afhangende borst. We verwijderen overtollige huid, liften de tepel en herschikken het borstweefsel tot een stevigere vorm.

Bij een borstvergroting vergroten we het volume van je borsten. Hiervoor gebruiken we je eigen vetweefsel of een silicone prothese of implantaat.



Borstverkleining

borstreductie

Te zware of hangende borsten veroorzaken soms problemen zoals nek- en rugpijn, of ongemakken bij het sporten. Je borsten operatief laten verkleinen kan dan een oplossing zijn.



Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.



Botoxbehandeling bij neurologische aandoeningen

inspuiting met botox

We spuiten een kleine hoeveelheid botulinumtoxine of botox in bepaalde spieren in. Dat zorgt ervoor dat de zenuwen geen signaal naar die spieren sturen. Ze worden verlamd.



Botoxbehandeling uit esthetische overwegingen

Botulinetoxine is een stof die we gebruiken om je gezichtsspieren te ontspannen en dynamische rimpels zoals fronslijntjes of kraaienpootjes tijdelijk minder zichtbaar te maken.



Botuline-injecties

botulinebehandeling

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



Buikwandchirurgie

Een operatie aan je buik om bijvoorbeeld een buikwandbreuk, liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk te behandelen.



Buikwandcorrectie

abdominoplastie

Door zwangerschap of een gewichtsschommeling kan je buikwand verslappen. Met deze ingreep corrigeren we de huid, het onderhuids vetweefsel en de verslapte spieren.



Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglens en vervangen ze door een heldere implantlens in kunststof. Die gaat in principe levenslang mee.



Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige aanwassen rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.



Chemotherapie

behandeling met cytostatica of cytotoxische middelen

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen die de groei van kankercellen afremmen of de celdeling verstoren.



Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in de galweg.



Chronisch nierlijden zorgtraject

Samen met je huisarts doen we ons best om te vermijden dat je nieren verder verslechteren. We proberen te voorkomen dat je in een ernstige fase van nierfalen terechtkomt.



Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.



Corticosteroïden

cortisonen

Corticosteroïden zijn een synthetische variant van het bijnierschors hormoon. Ze onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam.



CPAP-therapie

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), CPAP-behandeling, CPAP-masker, slaapapneumasker, continue positieve luchtwegdruk, positievedrukmasker

CPAP is een apparaat dat verbonden is met een masker dat je op je gezicht plaatst als je slaapt. Het blaast continu kamerlucht in je keel en luchtwegen zodat je normaal kan ademen.



Dementiezorg voor ouderen

Voor dementie bestaat er momenteel geen genezende behandeling. We kunnen wel proberen het verstandelijk verlies en het verlies aan zelfredzaamheid tijdelijk te vertragen.



Desensibilisatietherapie voor huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat je veel minder allergisch reageert.



Desensibilisatietherapie voor insectengif

desensibilisatietherapie voor wespen- en bijengif

Je krijgt meermaals een lage dosis wespen- of bijengif toegediend. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat je veel minder allergisch reageert.



Diabeteszorg

Op de dienst Endocrinologie kan je terecht voor de opvolging van zowel diabetes type 1 als type 2 en zwangerschapsdiabetes.



Dialyse

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet



Dijlift

Een dijlift is een ingreep om huid- en vetoverschot aan de dijen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.

dialyse. Er zijn verschillende vormen van



Dilatatie

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).



Diple arthrodese

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven bewegen.



Doelgerichte therapie

doelgerichte medicijnen, targeted therapy

Doelgerichte geneesmiddelen werken in op specifieke eigenschappen van de kankercellen. Ze blokkeren bepaalde processen die leiden tot celdeling.



DRUJ prothese

Distal Radioulnar Joint prothese

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.



Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie geven we je een injectie terwijl we een echografie uitvoeren. Zo kunnen we de naald gericht sturen en zien we beter waar de medicatie terecht komt.



Elleboogprothese

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.



Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het slechte weefsel weg te nemen.



Endovasculair aneurysma

EVAR, endovasculair herstel

In het geval van een aneurysma plaatst de chirurg een kunststofbuis aan de binnenkant van het bloedvat om dit te herstellen. Je klachten verdwijnen hierna vrij snel.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.



Facelift

Een facelift is een ingreep die de tekenen van veroudering aan je gezicht en hals vermindert. Via een snee voor het oor spannen we de huid en onderliggende weefsellaag aan.



Gewrichtsprothese



Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine instrumenten in via een endoscoop.



Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.



Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



Galblaas- en galwegenchirurgie

glasblaasoperatie, galwegenoperatie, cholecystectomie

Een operatie aan je galblaas of galwegen waarbij de chirurg pijnlijke galstenen verwijdt



Glaucoomoperatie

Bij een gewrichtsprothese vervangen we je gewricht door een kunstgewricht. Mogelijke oorzaken zijn slijtage, een breuk, een aangeboren afwijking of het afsterven van het gewricht.

glaucoomchirurgie

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.



Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Hallux is Latijn voor grote teen. Hallux-chirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



Halslift

Een halslift is een ingreep om de huid ter hoogte van de hals strakker te maken en overtollig vet te verwijderen. Dit kan in combinatie met een facelift.



Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP, unicondylaire prothese

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen door een kunstversie.



Handrevalidatie

Bij een handprobleem zoals een breuk, reuma, een peesontsteking, een amputatie of een ziekte helpen we je om je hand opnieuw te leren gebruiken. We geven ook tips over ergonomie.



Hartrevalidatie

cardiale revalidatie, cardiologische revalidatie

Bij cardiologische revalidatie leer je oefeningen om de conditie van je hart weer op te bouwen na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie.



Hemodialyse

Bij hemodialyse leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren. Meestal zijn er wekelijks 3 dialysesessies van elk 4 uur nodig.



HIPEC-chirurgie (Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie)



Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie

Een combinatie van chirurgie en chemotherapie om één of meerdere tumoren uit je buikholte te verwijderen.

Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.



HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



Huidtumor verwijderen

Je kan bij de plastisch chirurg terecht voor het verwijderen van goedaardige en kwaadaardige huidletsels, zowel om medische als esthetische redenen.



Hysterectomie

baarmoederverwijdering, baarmoeder weghalen

Een hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de arts de baarmoeder geheel of gedeeltelijk wegneemt.



Immunotherapie

immuuntherapie

Bij immunotherapie wordt je immuunsysteem met geneesmiddelen aangepast of versterkt om kankercellen te bestrijden en te vernietigen.



Infiltratie

Infiltratie is een techniek waarbij een naald tot de bron van de pijn gaat. Daarna spuiten we een medicijn, ontstekingsremmer of pijnstiller in. Dit kan je klachten verminderen.



Infiltraties (van gewrichten)

inspuiting, gewrichtspunctie

Een infiltratie is een lokale behandeling waarbij we vocht uit een gewricht halen en er medicatie inspuiten.



Infiltraties bij het carpaletunnelsyndroom

inspuiting met ontstekingsremmers

Het carpaletunnelsyndroom omvat klachten in de hand en onderarm. We spuiten

ontstekingsremmers in de pols om ontsteking en druk op de zenuw te verminderen.



Infiltraties bij meralgia paresthetica

inspuiting met ontstekingsremmers

Meralgia paresthetica is een beknelde zenuw in het bovenbeen. We spuiten ontstekingsremmers rond de heupkam om pijn te verlichten.



Infiltraties bij occipitalisneuralgie

inspuiting met ontstekingsremmers

Occipitalisneuralgie is een ziekte waarbij de zenuwen in de nek en achterkant van het hoofd ontstoken raken. We spuiten ontstekingsremmers rond de zenuw om pijn te verlichten.



Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheekunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



Inhalatietherapie

Bij deze therapie adem je medicijnen in via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten.



Inwendige en uitwendige neuscorrectie

septorhinoplastie

Bij een in- en uitwendige neuscorrectie veranderen we de vorm van je neus om de functie en/of het uitzicht van je neus te verbeteren.



Katheters en poortkatheters plaatsen

Een katheter is een buisje dat we rechtstreeks in een ader inbrengen om medicatie toe te dienen of om bloed af te nemen.



Kijkoperatie borstkas

video-assisted thoracoscopic surgery, video-assisted thoracic surgery, VATS



Kijkoperatie keel en strottenhoofd

pandendoscopie

Deze kijkoperatie is op dit moment de meest gebruikte techniek. Onder volledige verdoving (narcose) maakt de chirurg 1, 2 of 3 kleine sneetjes in de borstkasholte.

Met een soort buis (scoop) bekijkt de arts je mond- en keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en slokdarm. Het doel is om verdachte weefsels op te sporen en te laten onderzoeken.



Kinesithérapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



Kinesithérapie rond de bevalling

perinatale kinesithérapie, prenatale kinesithérapie, postnatale kinesithérapie

Met kinesithérapie maak je de spieren van je bekkenbodemp weer sterker na een bevalling of bereid je je voor op de bevalling met oefeningen en ademhalingstechnieken.



Klassieke reumamedicatie

Klassieke reumamedicatie onderdrukt gewrichtsontstekingen.



Klinische studies Oncologie

experimentele kankerbehandeling, trial

Klinische studies vormen de basis van de medische vooruitgang. Ze onderzoeken nieuwe behandelingen of nieuwe combinaties van behandelingen en hun werkingsmechanisme.



Knieprothese op maat

maatprothese

Een knieprothese is een kunstknie. Bij een maatprothese wordt op basis van een scan gekeken hoe de prothese best gepositioneerd wordt volgens jouw specifieke anatomie.



Laserbehandeling voor oogandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.



Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie



Ligamenten vastzetten

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het schouderblad.

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduum, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



Liposuctie

liposculptuur, vetverwijdering

Bij een liposuctie verwijderen we onderhuids vet door het weg te zuigen. Zo verminderen we lokaal opgestapeld vet.



Littekencorrectie

Een operatie waarbij de chirurg het huidige litteken uitsnijdt en de opening opnieuw aan elkaar hecht.



Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.



Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.



Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.



Maagchirurgie

Een operatie aan je maag om bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren in je maag te verwijderen.



Maagverkleining maagpouch via slokdarm

Ook wel Transoral Outlet Reduction (TORe) genoemd.



Maagverkleining via de slokdarm

Ook endoscopische sleeve gastroplastiek of ESG genoemd. Via je slokdarm verkleint de

chirurg je maag met verschillende hechtingen.



Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



Medicatie voor reuma

De behandeling van reumatische aandoeningen is afhankelijk van het type reuma en van de patiënt zelf.



Microscopische discectomie

discotomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw aandrukt. De arts verwijdert de schijf om de druk te verlichten.



Middenoorinspectie

We bekijken en controleren de beweeglijkheid van de gehoorbeentjes en proberen je gehoor te verbeteren. Als er een gaatje in je trommelvlies zit, maken we dat ook dicht.



Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



Neuscorrectie

rhinoplastiek

Met een neuscorrectie wijzigen we de vorm of grootte van de neus. Dat gebeurt om esthetische redenen, maar soms ook om ademhalingsproblemen te verhelpen.



Neustussenschotcorrectie

septumcorrectie, septoplastie

Het neustussenschot (septum) verdeelt je neus in 2 holtes. Bij een neustussenschotcorrectie zetten we het



Niersteenpreventie

Om niersteenvorming te voorkomen geven we je richtlijnen over hoeveel je best drinkt en wat je wel/niet eet. Ook kunnen we soms preventieve medicatie opstarten.

opnieuw recht zodat je weer beter door je neus kan ademen.



Niersteenverwijdering door de huid

percutane niersteenverwijdering, percutane nefrolitholapaxie (PNL), PCNL, nefrolithotomie

Met een naald prikt de uroloog door je huid je nier aan. Via een hol buisje worden daarna de nierstenen weggenomen.



Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier. Uw arts beoordeelt of u in aanmerking komt en volgt u nadien op. De ingreep gebeurt in een Belgisch transplantatiecentrum.



Nierverwijdering

verwijdering of wegname nier of een gedeelte ervan, verwijdering niergezwel of niertumor, partiële of radicale nefrectomie, robot geassisteerde partiële nefrectomie, RAPN

Bij een (partiële) nefrectomie neemt de uroloog (een deel van) je nier weg. Soms wordt ook de urineleider weggenomen, in dat geval spreken we over een nefro-ureterectomie.



Niet-invasieve beademing

niet-invasieve ventilatie, thuisventilatie, non-invasieve ventilatie, NIV

Bij sommige aandoeningen is je lichaam niet meer in staat om op een juiste manier zuurstof op te nemen en koolzuur uit te ademen. Een thuisbehandeling kan mogelijk aangewezen zijn.



Oefenprogramma bij fibromyalgie

Wie aan fibromyalgie lijdt, heeft last van spierpijn. Bewegen in water (hydrotherapie) kan dan deugd doen, omdat het lichaam onder water je gewicht niet hoeft te dragen.



Oncologische slokdarmheelkunde

Een operatie aan je slokdarm om kwaadaardige tumoren in je slokdarm te verwijderen.



Ontstekingsremmende pijnstillers bij reuma

NSAID's (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs)



Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochttruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht

Ontstekingsremmende pijnstillers zijn geneesmiddelen die ontstekingen verminderen en pijn verlichten.

(vitreum) van het oog om bepaalde netvliesandoeningen te behandelen.



Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, bipten genomen van letsels in de oogkas of tumoren verwijderd.



Ooglidcorrectie

dermatochalasiscorrectie, blefaroplastie

Tijdens een ooglidcorrectie neemt de oogarts of plastisch chirurg overtollige huid en/of vet van de bovenste en/of onderste oogleden weg.



Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dichterbij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd worden.



Openen smalle bloedvaten

Om een versmalling in de bloedvaten weer open te krijgen werkt de chirurg met een ballonnetje. Als dat niet of nauwelijks werkt, kan er een metalen buisje (stent) geplaatst worden.



Operatie aan je lever

Je lever maakt gal, stollingsfactoren en eiwitten aan. Het zet ook voedingsstoffen om naar energie.



Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



Operatie bij endeldarm- of rectumkanker

De chirurg verwijdert operatief je endeldarm en het omliggende weefsel. Als de kwaadaardige tumoren naast je sluitspier



Operatie bij hallux rigidus

operatie teenartrose, stijve grote teen opereren

Deze ingreep kan je laten uitvoeren wanneer je grote teen stijf is omdat het kraakbeen in

liggen, dan neemt de arts ook je sluitspier en je anus weg.

het gewricht versleten is.



Operatie bij hallux valgus

hallux-valgus-operatie, operatie scheve grote teen

Een hallux-valgus-operatie is een ingreep die je kan laten uitvoeren als je grote teen scheef staat en pijnlijk is. De arts zet dan de botten van je teen weer recht.



Operatie borstkas (open heilkunde)

Thoracotomie

Bij een thoracotomie maken artsen de borstkas open tussen de ribben, een klassieke toegang voor de behandeling van longkanker.



Operatie carpaletunnelsyndroom

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.



Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



Operatie tegen snurken en slaapapneu

uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)



Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere

Bij deze operatie verkleinen we het zachte gehemelte. In het geval van slaapapneu nemen we ook je keelamandelen weg.

behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



Operatie van een ingegroeide teennagel

De chirurg behandelt en verwijdert operatief de ingegroeide teennagel.



Opvolging na niertransplantatie

Na uw transplantatie volgen we u op, controleren uw transplantnier en regelen uw medicatie. Stipte medicatie inname en een gezonde levensstijl blijven essentieel.



Orchidopexie bij volwassenen

behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal, behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde testis, behandeling niet-scrotale testis, behandeling cryptorchidie

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de uroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Orthese

Een orthese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel beschermt of ondersteunt, zoals een korset of steunzolen. Het is niet hetzelfde als een prothese, dat een lichaamsdeel vervangt.



Orthopedische revalidatie

Tijdens dit oefenprogramma bouwen we je kracht op, vergroten we de beweeglijkheid van je gewricht en verbeteren we de stabiliteit van het gewricht en lichaam.



Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



Parkinsonrevalidatie

Door de ziekte van Parkinson sterven er zenuwcellen af. Hierdoor kan je minder goed bewegen. Met Parkinsonrevalidatie leren andere, gezonde zenuwcellen om functies over te nemen.



Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet

goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.



Peritoneale dialyse

buikspoeling

Bij peritoneale dialyse wordt via een katheter in je buik spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Peritoneale dialyse gebeurt dagelijks en kan zowel 's nachts als overdag.



PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en plaatst een metalen pinnetje of een schroefje.



PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwtvormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwtvormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



Plaatsing JJ-stent

plaatsing dubbel J-stent, plaatsing ureterstent

Een dubbel-J-stent is een dun slangetje met aan de twee uiteinden een krul. In de twee krullen zitten gaatjes om de afloop van urine van de nier naar de blaas te bevorderen.



POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat



Polsprothese

Bij een polsprothese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is. Na de ingreep kan je minder, maar nog voldoende bewegen.

voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.



Predialyse

Als uw nierfunctie ernstig verminderd is bekijken we samen de mogelijke opties van nierfunctievervangende therapie. Je krijgt uitgebreide info over alle behandelingsopties.



Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.



Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



Pyleoplastie bij volwassenen

pyelumplastiek, behandeling vernauwing tussen nierbekken en urineleider

Tijdens een pyleoplastie neemt de uroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Reconstructie voorste kruisband

Voorstekruisbandoperatie, operatie gescheurde kruisband, voorste kruisbandreconstructie, VBK

Bij deze operatie krijg je een nieuwe voorste kruisband in je knie, gemaakt uit andere pezen van je lichaam.



Reconstructieve chirurgie

Met deze chirurgie herstellen we een chronische wonde of een lichaamsdeel dat afwezig of vervormd is. Het probleem kan aangeboren zijn of het gevolg van een ongeval of ziekte.



Redo-chirurgie

Aanpassingen van eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperaties.



Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.



Revalidatie na amputatie

Na een amputatie helpt een multidisciplinair team je om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om te gaan met het letsel en eventueel te wennen aan je prothese - als je er een hebt.



Revalidatie na bloedkanker

sport na een hematologische maligniteit

We hebben een bewegingsprogramma voor patiënten die herstellen van een kwaadaardige bloedziekte. De oefeningen helpen patiënten om zich beter, sterker en minder vermoeid te voelen.



Revalidatie na een niet aangeboren neurologische aandoening (NAH)

NAH-revalidatie

Een hersenletsel kan plots ontstaan, bijvoorbeeld na een ongeval, beroerte of ziekte. Bij je revalidatie streven we naar herstel en helpen we je om te gaan met de beperkingen.



Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Robotchirurgie voor het plaatsen van een prothese

ROSA-robot, RObotic Surgical Assistant, operatierobot, robotgeassisteerde prothese

De ROSA-robot is een navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij het plaatsen van een prothese.



Rugrevalidatie

behandeling van rugpijn

Rugrevalidatie is een vorm van ondersteuning bij terugkerende rugklachten. We trainen je spieren en leren je over ergonomie. We tonen je ook hoe je met de pijn kan omgaan.



Scaphoïdectomie

Bij een scaphoïdectomie verwijdert de arts het os scaphoïdeum. Dat is een van de acht kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



Schaamlipcorrectie

labiaplastie

Bij sommige vrouwen zijn de kleine schaamlippen groter dan de buitenste. Dit kan ongemakken of onzekerheid veroorzaken. We kunnen dit corrigeren, vaak onder lokale verdoving.



Schildklieroperatie

schildklierchirurgie, thyroïdectomie, wegname schildklier, verwijdering schildklier, schildklieringreep

Een operatie waarbij de arts je schildklier gedeeltelijk of volledig verwijdert. Je schildklier is een orgaan vooraan in je hals en zorgt voor de productie van hormonen in je bloed



Schouderprothese

kunstschouder, schouderimplantaat

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.



Schouderrevalidatie

Na een operatie of blessure aan je schouder is het belangrijk om goed herstellen. Tijdens dit traject leren we je om je schouder te ontlasten en nadien weer correct te gebruiken.



Shockwavetherapie

ESWT, shockwave, extracorporeal shockwave therapy, schokgolftherapie

ESWT of shockwavetherapie is een behandeling waarbij we met een apparaatje een schokgolf door een pees sturen. Hierdoor



Single Anastomosis Duodenal-Ileal bypass (SADI)

De arts combineert een sleeve gastrectomie met een darmomleiding. Hij verwijdert het maagdeel met de hongersensoren en leidt je 12-vingerige darm en een deel van je dunne darm om.



Spalk- of bracetherapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan spalken en braces voor je hand, pols en elleboog.



Sport na obesitaschirurgie

Dit is een bewegingsprogramma dat je kan volgen na een obesitasingreep. We proberen je gewichtsverlies te versnellen en leren je om te sporten op een manier die je kan volhouden.



Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.

wordt die pees gestimuleerd om zichzelf te herstellen.



Sinusoperatie

functionele endoscopische sinuschirurgie (FESS)

Bij een sinusoperatie maakt de NKO-arts via je neus de doorgangen van je sinussen (neusbijholten) weer open.



Sport bij diabetes

Met ons bewegingsprogramma helpen we je als diabetespatiënt een actieve levensstijl aan te nemen én vol te houden. Met beweging houd je je bloedsuikerspiegel beter onder controle.



Stembandoperatie

microlaryngoscopie

Bij een stembandoperatie neemt de NKO-arts afwijkingen op je stembanden weg, bijvoorbeeld een poliep (goedaardige zwelling) of een cyste (blaasje gevuld met vocht).



Sterilisatie bij mannen

vasectomie

Met een kleine ingreep onderbreekt de uroloog de zaadleiders ter hoogte van de balzak.



Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.



Stijgbeugeloperatie

stapedotomie, stapeschirurgie

We nemen het bovenste gedeelte van de aangetaste stijgbeugel (1 van de 3 gehoorbeentjes in je oor) weg en plaatsen een prothese die de geluidsgolven doorgeeft aan het binnenoor.



Stoppen met roken

ZAS organiseert regelmatig rookstopcursussen in groep.



Subtalaire arthrodese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



Tenodermodesese

Tenodermodesese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.



Therapeutische hysteroscopie

Kijkoperatie baarmoeder

Bij een therapeutische hysteroscopie kijkt de arts in de baarmoeder met een camera en voert ook meteen een ingreep uit. De camera zit op een buis die we inbrengen via de vagina.



Therapeutische laparoscopie

Kijkoperatie buikholte

Bij een therapeutische laparoscopie brengt de arts een camera en instrumenten in via sneetjes in de buik. Dat is minder ingrijpend dan een openbuikoperatie.



Thuishemodialyse

Soms is thuishemodialyse mogelijk. De patiënt voert zelf, of samen met een mantelzorger, de hemodialyse thuis uit. De Nierkliniek zorgt dan voor een intensieve begeleiding.



Totale heupprothese

kunstheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een kunstversie.



Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij deze prothese vervangt de arts het volledige kniegewricht door een kunstversie.



Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de traanzak en de neusholte. Zo kunnen de tranen weer via de neus worden afgevoerd.



Trapezectomie met het ligamentreconstructie

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.



Triple arthrodese

Een triple arthrodese is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



Trommelvliesbuisjes

plaatsing diabolos

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie



TUR blaas

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.

transurethrale resectie blaas (TURB), wegname blaastumor via plasbuis

Een TUR blaas dient om via je plasbuis blaastumoren weg te halen.



Vaccinaties bij reuma

Patiënten met reumatische aandoeningen hebben een hoger risico op bepaalde infecties. Die infecties kunnen ook gecompliceerder verlopen door hun ziekte en hun medicatie.



Vakantiedialyse

Te veel tekens Voorstel: Op vakantie in België? Zet je dialyse voort bij ZAS.

Ben je al nierpatiënt binnen ZAS, dan helpen we je graag met je vakantiedialyse.



Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



Verwijderen van een polscyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.



Vingeramputatie

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris



Vroegtijdige zorgplanning voor ouderen

Met een geriater, ergotherapeut, psycholoog en sociaal werker kan je over de toekomst

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



Wegname halscyste

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.

van je leven, de zorg die nog je wil en je levenseinde spreken.



Wegname halsfistel

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.



Wegname onderkaakspeekselklier

wegname glandula submandibularis, submandibulaire speekselklierwegname

Wegname van de volledige onderkaakspeekselklier kan nodig zijn bij chronische ontsteking (met steenvorming) of als er goedaardige of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn.



Wegname oorspeekselklier

wegname glandula parotis, parotidectomie

Oppervlakkige of totale wegname van de oorspeekselklier kan nodig zijn bij gezwellen van de oorspeekselklier zoals het pleiomorf adenoom en het adenolymfoom (Warthin-gezwel).



Wegname strottenhoofd

laryngectomie

Bij een laryngectomie nemen we je strottenhoofd (larynx) weg. De reden daarvoor is in de meeste gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).



Weke delen operatie



Zuurstoftherapie bij longaandoeningen

Dat zijn weefsels onder je huid die zich o.a. rond je organen, spieren en botten bevinden. De chirurg opereert bij o.a. huidletsels, lipomen, cysten, melanomen en sarcomen.

Via je neus of mond krijg je extra zuurstof. Daardoor moeten je longen en je hart minder hard werken.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-sint-jozef>