



Algemene afsprakenplanning en info

☎ [03 280 31 11](tel:032803111)

✉ pa.info@zas.be

Bezoekuren

Verpleegafdelingen: van 14 uur tot 19.30 uur

OVER

ZAS Paola

ZAS Paola is helemaal gericht op de zorg voor zieke kinderen. Kinderen en ouders nemen actief deel aan de behandeling. Zo proberen we een veilige omgeving te creëren waarbij de eigenheid van je kind centraal staat, want kinderen zijn geen mini-volwassenen.

Kinderartsen met verschillende subspecialisaties staan garant voor de kwaliteitsvolle aanpak binnen ZAS Paola. De brede waaier aan medische zorg die zij bieden, wordt aangevuld met behandelingen en onderzoeken van specialisten uit andere disciplines die ook zorg bieden aan kinderen.

Ontdek al onze diensten

Dit is een rookvrije campus

Deze campus is **volledig** rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangeduide rookzones.

Bereikbaarheid

Met de auto

Het adres van ZAS Paola is Lindendreef 1, 2020 Antwerpen.

[Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.](#)

ZAS Koningin Paola Kinderziekenhuis beschikt over een eigen betaalparking, voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Bij het binnenrijden krijg je een ticket waarmee je aan de automaat (links in de inkomhal) kan betalen voor je auto ophaalt.

Met de fiets


Je kan gebruik maken van de stadsfietsen van Velo Antwerpen. Meer info over de stadsfietsen en over de Velo-stations vind je op **[de website van Velo Antwerpen.](#)**

Velo-station 268 bevindt zich op de Lindendreef, ter hoogte van de hoofdingang van ZAS Middelheim.

Met het openbaar vervoer

- **[Gebruik Google Maps.](#)**

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- **[Gebruik de routeplanner van De Lijn](#)**
- **[Plan je treinreis op de website van NMBS](#)**

Bereken je route

ZAS Paola - Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Wandelafstand

▼

5 min

▼

Geef me reisadvies

Filters en lagen

▼

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner omvat. Deze widget maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van de widget om die verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar Antwerpen opslaat zijn:

- Hoe vaak wordt er op de knoppen 'toon op kaart' en 'geef me reisadvies' geklikt binnen de widget?
- Vanuit welke site wordt er op deze knoppen geklikt binnen de widget?

Voorzieningen

Zusje vragen het over de verwerking van deze gegevens, kan je altijd de Data Protection Officer van stad Antwerpen contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Horeca

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Bezoekerscafetaria 03 280 38 34	Dranken, snacks, gebak, belegde broodjes en warme gerechten	in de grote hal van het naburige ZAS Middelheim	Maandag tot vrijdag 8 uur - 19 uur Weekends en feestdagen

			14 uur - 18 uur
Koffiecorner Aspretto	Thee en koffie, kleine snacks en gebakjes	Net voorbij de ingang van het naburige ZAS Middelheim	Maandag tot vrijdag 8 uur - 16 uur Weekends en feestdagen gesloten

Is de cafetaria gesloten? In onze campus ZAS Middelheim vind je op verschillende plaatsen automaten met dranken en snacks. Daar kan je dag en nacht terecht voor een verfrissing of snelle hap.

Winkel/apotheek

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Shop Middelheim	Snacks, boeken, tijdschriften, wenskaarten en bloemen	Net voorbij de ingang van het naburige ZAS Middelheim	Maandag tot vrijdag 7.30 uur - 19 uur Zaterdag 10 uur - 16 uur Zon- en feestdagen gesloten

Wifi/telefoon

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

Stille ruimte

Wil je even rust opzoeken? Bezoekers en patiënten zijn in ZAS Paola steeds welkom in de stille ruimte voor een moment van bezinning of gewoon om even op adem te komen.

Lees gratis online stripverhalen

Standaard Uitgeverij biedt via STRIPS.BE onze patiënten en bezoekers gratis en onbeperkt stripverhalen aan om te lezen op ons ZAS-netwerk. Ideaal als afleiding of om wachttijden wat sneller voorbij te laten gaan.

STRIPS.BE is een streamingplatform met een catalogus van duizenden stripverhalen: van De Kiekeboes, Suske en Wiske, Jommeke, Camille, De Blauwbloezen ... Voor jong en oud!

Hoe werkt het?

1. Verbind met het wifinetwerk van ZAS
2. Download de app STRIPS.BE op je smartphone of tablet (hier app-logo bijzetten)
3. Klik op het ZAS-icoon
4. Start met lezen!

Voor patiënten

Op kindermaat

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor kinderen. Om hun tijd hier zo zacht mogelijk te laten verlopen, heeft ZAS Paola een team van pedagogische medewerkers ter beschikking. Zij zorgen voor afleiding, bieden een luisterend oor en voorzien informatie op kindniveau over operaties of onderzoeken. Zo creëren ze voorspelbaarheid en veiligheid voor alle jonge patiënten.

Ziekenhuisschool

Mist je kind te veel lessen door een ziekenhuisopname? Dan kan hij of zij in het ziekenhuis naar school gaan. Patiëntjes tussen 2,5 en 18 jaar krijgen hier les en zorg op maat. De lessen vinden plaats in de voormiddag, in een speciaal ingericht leslokaal. Alles gebeurt in nauw overleg met de artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en ouders.

Heb je vragen? Op [de website van de buitengewone scholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen](#) vind je meer informatie.

Speellokaal

Alle kinderen hebben recht om te spelen, ook als ze ziek zijn. In ZAS Paola hebben we daarom een gezellig speellokaal ingericht met een aanbod voor alle leeftijden. Kinderen en jongeren die opgenomen zijn, vinden er onder meer boeken, duplo, lego, gezelschapspelletjes, knutselmateriaal en een playstation.

Het speellokaal is open van maandag tot vrijdag, van 9.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Patiëntjes kunnen er heen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Kan jouw kind de kamer niet verlaten door een risico op besmetting? Dan brengen we speelgoed tot op de kamer.

Diensten

 Filter deze pagina

1 - 9 van 27



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Expertisecentrum

Anesthesie voor kinderen

verdoving bij kinderen, pijnstilling bij kinderen



Dienst



Expertisecentrum

Cardiologie voor kinderen

hartziekte

CEPRA

cerebral palsy, hersenverlamming,
CP



Dienst

Chirurgie bij kinderen



Dienst

Diëtisten

voedingsadvies,
voedingsconsultatie



Dienst

Endocrinologie voor kinderen

kinderhormoonziekten, kinderen
met hormoonproblemen



Dienst

Fysische geneeskunde en revalidatie



Dienst

Gastro-enterologie voor kinderen

maag-darmaandoeningen bij
kinderen, leverproblemen bij
kinderen, voedingsproblemen bij
kinderen

Onderzoeken

[Filter deze pagina](#)

1 - 65 van 65



24-uurs urinecollectie

Om in te schatten hoeveel de nieren nu precies van een bepaalde stof uitscheiden, kan het zinvol zijn om de urine van een volledige dag en nacht op te sparen en te onderzoeken.



24-uursbloeddrukmeting

Een draagbaar apparaat meet op vaste tijdstippen en tijdens dagelijkse activiteiten je bloeddruk. Deze reeks metingen geeft een objectief beeld van je bloeddruk.



24uurs pH- impedantiemeting

reflux, refluxziekte, zuurtegraadmeting, impedantie

De kindergastro-enteroloog meet de zuurtegraad en de terugvloeit van vloeistoffen en/of lucht in de slokdarm. Dit onderzoek gebeurt met een kleine sonde via de neus.



Ademtesten

Ademtesten worden onder andere gebruikt om na te gaan of je kind bepaalde voedingsstoffen niet verteert, er bepaalde bacteriën aanwezig zijn in de maag ...



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest, uitlokkingstest, provocatietest



Allergietest bij kinderen

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.

bepaalde stoffen of allergenen.



Arteriële katheter

Een arteriële katheter is een kunststof buisje dat direct in een slagader wordt geplaatst.



Artrografie

Artrografie is een onderzoek waarbij we contrastvloeistof in een gewricht injecteren en er daarna röntgenbeelden van maken.



Blaasfunctieonderzoek bij kinderen

blaasonderzoek bij kinderen, urodynamisch onderzoek (UDO) bij kinderen

De kinderuroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme van je kind. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



Bloedonderzoek voor de nieren

Om te kijken hoe goed de nieren werken, controleren we het bloed op creatinine. Als de creatinewaarde hoog is, kan dat wijzen op nieren die minder goed werken.



Centraal veneuze katheter

Een centraal veneuze katheter is een kunststof buisje dat de arts in een grote ader plaatst.



Coloscopie bij kinderen

kijkonderzoek van de dikke darm, colonoscopie bij kinderen

Tijdens dit onderzoek controleert de kindergastro-enteroloog de binnenzijde van de dikke darm op ontstekingen, poliepen of andere afwijkingen.



Contrastonderzoek

Inwendig onderzoek

Je krijgt een contrastvloeistof in je lichaam via drinken of via een sonde in de blaas of



Coronarografie

röntgenonderzoek kransslagaders

De arts brengt via je pols of lies een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter

darmen. Na enkele röntgenfoto's zie je dat de vloeistof zijn weg vindt in het lichaam.



Drukmeting bij de ziekte van Hirschsprung

Bij de drukmeting wordt een dun slangetje met een ballonnetje in de anus gebracht. Dit ballonnetje blazen we op om de druk in de anus te meten.

spruit hij contraststof en röntgenstralen in die de kransslagaders in beeld brengen.



Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie bij kinderen

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie van de balzak

echografie scrotum, echoscopie

Bij dit onderzoek brengen we een gel aan op de buitenkant van de balzak. Daarna plaatsen we een echoapparaat op de huid om de weefsels van de balzak te kunnen zien op een scherm.



Echografie van de blaas

echo van de blaas, echoscopie van de blaas

Tijdens een echografie van de blaas bekijkt de uroloog of nefroloog de blaas met een echoapparaat. Dit onderzoek is pijnloos.



Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden (schrompelnieren)? Zijn er niercysten?



Echografie van nieren en blaas

Via een echo kijken we naar de nieren, blaas en urinewegen om afwijkingen vast te stellen. Ook kunnen we daarmee kijken of er na plassen nog urine achterblijft in de blaas.



Elektro-encefalogram

Een EEG (elektro-encefalogram) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.



Endoscopie

Een endoscopie is een onderzoek waarbij we een dunne buis via een lichaamsopening (zoals de mond of anus) naar binnen brengen om organen aan de binnenkant te bekijken.



Endotracheale tube

De endotracheale tube wordt via mond (of neus) in de luchtpijp gebracht om de beademing patiënt te kunnen beademen via de beademingsmachine.



Epidurale pijnstilling

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (ruggenprik) dient de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug.



Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de evenwichtsorgaanjes in je binnenoor en geven we de werking van je evenwichtssysteem weer in grafieken.



Full thickness biopt

Soms komt uit de onderzoeken niet meteen een duidelijke diagnose. Dan voeren we een extra biopsie uit, de full thickness biopt.



Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftellingen (toonhoogte).



Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP) , Goldmann gezichtsveldonderzoek

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



Huidpriktest bij kinderen

Met een huidpriktest wordt nagekeken of er sprake is van allergie.



Kijkonderzoek longen bij kinderen

endoscopie longen bij kinderen, endoscopie luchtwegen bij kinderen, bronchoscopie bij kinderen

Bij een bronchoscopie kijkt de kinderlongarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in de luchtwegen.



Intracraniële katheter

Een intracraniële katheter wordt in het operatiekwartier geplaatst door de neurochirurg tussen de twee hersenhelften.



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie, cystoscopisch onderzoek

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas. Dat gebeurt onder lokale verdoving.



Kleurenechografie

Een kleurenechografie brengt via een probe op de borstkas of slokdarmsonde de structuur en bloedstroom binnen het hart gedetailleerd in beeld.



Kleurstoffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.



Klinisch onderzoek orthopedie

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



Longfunctieonderzoek bij kinderen

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere het volume en de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Maagonderzoek bij kinderen

gastroscopie, kijkonderzoek van de slokdarm, maag en dunne darm



Microscopisch ooronderzoek

micro-otoscopie

Tijdens dit onderzoek controleert de kindergastro-enteroloog de binnenkant van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de dunne darm.

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



Neusonderzoek

neusendoscopie, endoscopie neus, nasale endoscopie, nasofaryngoscopie, kijkonderzoek neus

Bij een neusendoscopie schuift de NKO-arts via een neusgat een flexibel of star buisje met daarop een camera (endoscoop) in je neus om de binnenkant van je neus te bestuderen.



Nierbiopsie

nierweefselonderzoek

Bij een nierbiopsie nemen we onder plaatselijke verdoving een klein stukje nierweefsel weg voor onderzoek onder de microscoop.



Onderzoek van urine

Afwijkingen in de urine, zoals de aanwezigheid van eiwit of bloed, kunnen wijzen op een ziekte van de nieren.



Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatie-



Oogonderzoek bij kinderen

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en

tonometer of met een 'luchtpuf'
(luchttonometrie of pneumotonometrie).

onderzoeken het hoornvlies, de lens, de
oogzenuw en het netvlies.



Percutane tracheotomie

De percutane tracheotomie is voor patiënten
die langdurige beademing nodig hebben.



Perifere katheter

Een perifere katheter zorgt ervoor dat vocht
en medicijnen rechtstreeks via de bloedbaan
worden toegediend.



Ph-meting

Om de ernst van reflux te bepalen meten we
de zuurgraad met een sonde in de slokdarm.
Soms voeren we de ph-meting 48 uur uit om
het effect van de medicijnen tegen reflux te
meten.



Picco- of SwanGanzKatheter

Deze speciale katheters worden in een
centrale ader of slagader geplaatst. Met
deze katheters kunnen we het hartdebiet en
de vullingstoestand opvolgen.



Pijnmeting bij kinderen

Om pijn goed te kunnen behandelen, moet
het eerst duidelijk zijn hoe ernstig de pijn is.
Om dat te weten te komen, geeft je kind of
de verpleegkundige de pijn een 'score'.



Plaskalender voor kinderen

mictielijst voor kinderen

De kinderuroloog kan je vragen een
plaskalender bij te houden. Je schrijft
hiervoor, meestal 2 dagen, op hoeveel en
wanneer je kind drinkt en plast.



Preoperatieve voorbereiding bij kinderen

preoperatief nazicht, preoperatieve screening bij
kinderen (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie bij je
kind de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en
volledig mogelijk invult en onze verdere
instructies opvolgt.



Rechterhartkatherisatie

De arts brengt een katheter in en schuift het
naar je hart. Via de katheter meet hij de druk,
het hartdebiet en het zuurstofgehalte.



Röntgenfoto bij de ziekte van Hirschsprung

Via de anus brengen we contrastvloeistof in de dikke darm. Zo wordt de darm zichtbaar op de foto. Bij de ziekte van Hirschsprung is de endeldarm nauw en de dikke darm juist wijder.



Röntgenonderzoek bij kinderen

radiografie bij kinderen, RX bij kinderen, RX-onderzoek bij kinderen, conventionele radiologie, röntgenfoto bij kinderen

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en structuren van je lichaam zichtbaar. Soms krijg je een contrastmiddel toegediend.



Slijmvliesbiopsie van de endeldarm

Er wordt een klein stukje slijmvlies uit de endeldarm gezogen. Dat onderzoeken we onder de microscoop. Zien we verdikte zenuwvezels? Dat kan wijzen op de ziekte van Hirschsprung.



Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd, kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een kunststof buis die tussen de twee longbladen geplaatst wordt om vocht en/of lucht weg te laten lopen of weg te kunnen zuigen.



Urineonderzoek

plasonderzoek

Een urineonderzoek geeft informatie over de aanwezigheid van rode of witte bloedcellen, bacteriën, schimmels of kristallen in de urine.



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van je plasstraal te meten. Je plast daarvoor in een flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.



Voedselprovocatietest

provocatietest voedselallergie, testen op voedselallergie, allergieprovocatietest

Tijdens een voedselprovocatietest krijg je kleine beetjes van een bepaald voedingsmiddel om op een veilige manier te



Zweettest bij kinderen

Met een zweettest wordt mucoviscidose ofwel taaislijmziekte nagekeken.

weten te komen of je er nog allergisch op reageert.

Behandelingen

Filter deze pagina

1 - 136 van 136



Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesithérapie of een operatie.



Amandeloperatie

tonsillectomie

Bij een amandeloperatie neemt de NKO-arts via je mond je amandelen (tonsillen) weg.



Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



Antirefluxoperatie

De overgang tussen slokdarm en maag wordt aangepast zodat voedsel vanuit de maag niet meer terug naar de slokdarm gaat. De operatie duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.



Antirefluxprocedure bij kinderen

antiterugvloeiprocedure bij kinderen, behandeling vesico-ureterale reflux (VUR) bij kinderen

De terugvloeï van urine wordt behandeld door een product in te spuiten in de uitgang van de urineleider. Een piepkleine camera en een naaldje worden in de plasbuis ingebracht.



Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.



Arthroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



Behandeling dysfagie bij kinderen

De logopedist adviseert je kind over wat hij/zij al dan niet mag eten of drinken en leert een juiste lichaamshouding aan. Deze correcte houdingen worden meermaals ingeoefend.



Behandeling eet- en drinkproblemen bij kinderen

De logopedist focust zich op het verbeteren van de eet- en drinkvaardigheden van je kind. Aan de hand van oefeningen leren ze een juiste lichaamshouding en technieken aan.



Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.



Behandeling heupdysplasie bij kinderen

Als het heupgewricht van je kindje niet goed ontwikkeld is, kan de arts dat proberen te corrigeren met een spreidbroekje, een gipsbroekje of, als het nodig is, een operatie.



Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.



Behandeling hoge anorectale malformatie

De behandeling bestaat uit drie stappen: je kind krijgt een tijdelijke stoma. Tijdens een tweede operatie wordt een anus gemaakt. Met een derde operatie wordt de stoma verwijderd.



Behandeling hydrocoele bij kinderen

behandeling hydrocele bij kinderen, behandeling vochtophoping in de balzak bij kinderen, behandeling waterbreuk bij kinderen

Vochtophoping in de balzak kan tot de leeftijd van twee jaar vanzelf verdwijnen. Na die leeftijd verwijdert de kinderuroloog het vocht tijdens een operatie.



Behandeling hypospadie bij kinderen

behandeling hypospadias bij kinderen

Afhankelijk van de ernst van de hypospadie beslist de kinderuroloog of een operatie nodig is om de plasbuis en de eikel te reconstrueren. Niet alle vormen moeten behandeld worden.



Behandeling klompvoeten

Bij een klompvoet staat de voet van je baby in een verkeerde hoek. De behandeling bestaat onder meer uit het herhaaldelijk gipsen van de voet en het verlengen van de achillespees.



Behandeling teelbaltorsie bij kinderen

behandeling torsio bij kinderen, behandeling teelbaldraaiing bij kinderen

De kinderuroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast



Behandeling varicocoele bij kinderen

behandeling varicocele bij kinderen, behandeling spatader aan de teelbal bij kinderen

Bij jonge kinderen bindt de uroloog de spatader in de teelbal toe onder volledige

aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.

verdooving. Bij oudere kinderen maakt de radioloog het bloedvat dicht onder plaatselijke verdooving.



Behandeling ziekte van Perthes

Kinderen met de ziekte van Perthes krijgen advies het heupgewricht zoveel mogelijk te ontlasten. Kinesithérapie kan deel uitmaken van de behandeling. Sporten mag enkele jaren niet.



Bekkenbodemkinesithérapie

bekkenbodemtherapie, bekkenbodemkiné,
bekkenbodemoefeningen,
bekkenbodemspieroefeningen, pelvische reëductie

Met bekkenbodemkinesithérapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodemspieren.



Besnijdenis bij kinderen

circumcisie bij kinderen, besnijding bij kinderen

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de kinderuroloog een deel of de volledige voorhuid van de penis weg.



Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.



Botuline-injecties

botulinebehandeling

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep



Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglenzen en vervangen ze door een heldere implantlens in kunststof. Die gaat in principe levenslang mee.

aanwassen rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.



Chronisch nierlijden zorgtraject

Samen met je huisarts doen we ons best om te vermijden dat je nieren verder verslechteren. We proberen te voorkomen dat je in een ernstige fase van nierfalen terechtkomt.



Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.



Dialyse

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet dialyse. Er zijn verschillende vormen van dialyse.



Diplo arthrodesse

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven bewegen.



Doorhaaloperatie bij M. Hirschsprung

Het stuk abnormale dikke darm wordt weggehaald tijdens een kijkoperatie via de anus. Dit gebeurt als je kind vier weken à zes maanden oud is.



DRUJ prothese

Distal Radioulnar Joint prothese

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.



Elleboogprothese

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan

bewegen.



Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.



Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



Glaucoomoperatie

glaucoomchirurgie

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.



Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Hallux is Latijn voor grote teen. Hallux-chirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



Halsfistel verwijderen

De halsfistel wordt onder volledige verdoving verwijderd tijdens een operatie.



Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP, unicondylaire prothese

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen door een kunstversie.



Hemodialyse

Bij hemodialyse leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren. Meestal zijn er wekelijks 3 dialysesessies van elk 4 uur nodig.



Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie

Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.



Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is een therapie die we inzetten om zuurstoftekort in beschadigde weefsels te herstellen.



Infiltraties (van gewrichten)

inspuiting, gewrichtspunctie

Een infiltratie is een lokale behandeling waarbij we vocht uit een gewricht halen en er medicatie inspuiten.



Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheelkunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



Kinesithherapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



Kinesithherapie bij kinderen

fysiotherapie bij kinderen

Zorg voor het lichaam van je kind via beweging



Laserbehandeling voor oogaandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.



Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het schouderblad.



Liesbreukoperatie

De liesbreuk wordt via een kijkoperatie of open benadering hersteld. Tijdens de operatie sluiten we de doorgang van de buik naar de lies.



Ligamenten vastzetten

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduum, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.



Maagsonde

Een maagsonde is een kunststof buisje dat via de neus of uitzonderlijk via de mond naar de slokdarm tot in de maag geplaatst wordt.



Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



Medicatie via een infuus

Sommige medicaties kan je kind niet thuis innemen. Dan dienen we de medicatie via een infuus toe, in het dagziekenhuis.



Microscopische discectomie

discectomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw aandrukt. De arts verwijdert de schijf om de druk te verlichten.



Middenrifbreukoperatie

Tijdens deze operatie brengt de chirurg buikorganen zoals darmen, milt of lever opnieuw in de buik. Zo krijgen de longen en het hart weer ruimte.



Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning

Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning van vitale functies en parameters (temperatuur, bloeddruk ...) om zo complicaties te voorkomen door snel in te grijpen.



Navelstrengbreuk herstellen

Afhankelijk van de grootte van de breuk vindt de operatie in de dagen na de geboorte plaats of later.



Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



Neuscorrectie

rhinoplastiek

Met een neuscorrectie wijzigen we de vorm of grootte van de neus. Dat gebeurt om esthetische redenen, maar soms ook om ademhalingsproblemen te verhelpen.



Niersteenpreventie

Om niersteenvorming te voorkomen geven we je richtlijnen over hoeveel je best drinkt en wat je wel/niet eet. Ook kunnen we soms preventieve medicatie opstarten.



Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier. Uw arts beoordeelt of u in aanmerking komt en volgt u nadien op. De ingreep gebeurt in een Belgisch transplantatiecentrum.



Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochttruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht (vitreum) van het oog om bepaalde netvliesafwijkingen te behandelen.



Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, biopsieën genomen van letsels in de oogkas of tumoren verwijderd.



Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dichterbij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd

worden.



Operatie bij overmatig zweten

Tijdens de operatie schakelen we de zenuw uit die voor overmatig zweten zorgt. Dat gebeurt via een kijkoperatie in de borstkas en heet 'Endoscopische Thoracale Sympathectomie'.



Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.



Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



Operatie carpaletunnelsyndroom

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



Operatie van lage anorectale malformatie bij jongens

De anus wordt operatief verplaatst zodat die binnen de kringspier komt. Je kind blijft een paar dagen in het ziekenhuis.



Operatie van lage anorectale malformatie bij meisjes

De operatie hangt af van de malformatie af.



Opvolging na niertransplantatie

Na uw transplantatie volgen we u op, controleren uw transplantnier en regelen uw medicatie. Stipte medicatie inname en een gezonde levensstijl blijven essentieel.



Opvolging urineverlies bij kinderen

opvolging urine-incontinentie bij kinderen, opvolging bedplassen bij kinderen, opvolging broekplassen bij kinderen

Is je kind ouder dan 4 jaar en plast het overdag nog regelmatig in de broek? Bespreek het dan met je arts. Bedplassen wordt aanvaard tot de leeftijd van 7 jaar.



Orchidopexie bij kinderen

behandeling van een niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de kinderuroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.



Pijnbeleid bij kinderen

ZAS doet er alles aan om pijn, angst en stress bij je kind te voorkomen en verzachten.



PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



Polsprouthese

Bij een polsprouthese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is. Na de ingreep kan je minder, maar nog voldoende bewegen.



Preventie huisstofmijt

Dermatophagoides pteronyssinus, stofmijt



Peritoneale dialyse

buikspoeling

Bij peritoneale dialyse wordt via een katheter in je buik spoelvlloeistof in de buikholtte gebracht. Peritoneale dialyse gebeurt dagelijks en kan zowel 's nachts als overdag.



PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en plaatst een metalen pinnetje of een schroefje.



Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwttormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwttormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



Predialyse

Als uw nierfunctie ernstig verminderd is bekijken we samen de mogelijke opties van nierfunctievervangende therapie. Je krijgt uitgebreide info over alle behandelingsopties.



Preventie voedselallergie bij kinderen

De huisstofmijt is een van de meest voorkomende bronnen van allergie, ook bij kinderen. Met deze tips en voorbereiding maak je je huis zo huisstofmijtvrij mogelijk.

allergiepreventie, voedingsallergie

In de preventiepoli maken we jonge kinderen vertrouwd met bepaalde voedingsstoffen. Zo verkleinen we de kans op een voedselallergie.



Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.



Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



Pyeloplastie bij kinderen

pyelumplastiek

Tijdens een operatie neemt de kinderuroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Reisvaccinatie bij kinderen

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Ook kinderen kunnen gevaccineerd worden. Vraag je kinderarts om meer informatie.



Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel



Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te

van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.

herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



RSV-preventie

Je kan je baby beschermen tegen het RSV-virus met een inspuiting die wordt terugbetaald door de mutualiteit, of door je als moeder te laten vaccineren tijdens de zwangerschap.



Scaphoïdectomie

Bij een scaphoïdectomie verwijdert de arts het os scaphoïdeum. Dat is een van de acht kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



Scheelzienoperatie bij kinderen

strabismechirurgie bij kinderen, strabisme-operatie bij kinderen, oogspieroperatie bij kinderen

We verzwakken of versterken de oogspieren die aan de buitenkant van de oogbol vastzitten door ze te verplaatsen of in te korten. Zo kunnen we de stand van de ogen corrigeren.



Schouderprothese

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.



Spalk- of brace therapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan spalken en braces voor je hand, pols en elleboog.



Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze



Subtalaire arthrodesese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je

kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.

onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



Tenodermodese

Tenodermodese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.



Thuishemodialyse

Soms is thuishemodialyse mogelijk. De patiënt voert zelf, of samen met een mantelzorger, de hemodialyse thuis uit. De Nierkliniek zorgt dan voor een intensieve begeleiding.



Tijdelijke overname

Tijdelijke overname van de ademhaling, nierfunctie en/of andere levensnoodzakelijke functies tot de patiënt opnieuw volledig zelfstandig kan functioneren.



Totale heupprothese

kunstheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een kunstversie.



Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij deze prothese vervangt de arts het volledige kniegewricht door een kunstversie.



Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de



Trapezectomie met het ligamentreconstructie

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.

traanzak en de neusholte. Zo kunnen de



Triple arthrodese

Een triple arthrodese is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



Trommelvliesbuisjes

plaatsing diablo's

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.



Ureter-reïmpantatie bij kinderen

De kinderuroloog maakt de urineleider los van de blaas. Afhankelijk van de aandoening, maakt de kinderuroloog de urineleider op een verschillende plaats terug vast aan de blaas.



Vaccinatie tegen de griep

griepvaccin, influenzavaccin, griepsput

Kwetsbare mensen en hun naasten kunnen zich tegen de griep beschermen door zich jaarlijks te laten vaccineren tussen oktober en december.



Vaccinatie tegen meningokokken type B

Vaccin tegen meningokokken type B

Aanvullend op het vaccin tegen meningokokken, dat al in het standaard vaccinatieschema zit, bestaat er ook een



Vaccinatie tegen windpokken

vaccinatie tegen Varicella

Het vaccin tegen de windpokken behoort momenteel niet tot het standaard vaccinatieschema. Bespreek met je kinderarts of dit aanvullend vaccin nuttig is voor jouw kind.

bijkomend vaccin tegen meningokokken type



Vakantiedialyse

Te veel tekens Voorstel: Op vakantie in België? Zet je dialyse voort bij ZAS.

Ben je al nierpatiënt binnen ZAS, dan helpen we je graag met je vakantiedialyse.



Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



Verwijderen van een polscyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.



Vingeramputatie

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



Volledige verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen

Bij een algemene verdoving wordt het hele lichaam verdoofd. Bij kinderen gebeurt dat meestal met een maskertje waarlangs ze een slaapverwekkend gas inademen.



Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



Wegname halscyste

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.



Wegname halsfistel

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-paola>